

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แบ่งออกเป็น 7 ตอน ดังนี้

- ตอนที่ 1 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง
- ตอนที่ 2 รายละเอียดของแหล่งความเครียดของญาติผู้ป่วยโรคจิตเภท
- ตอนที่ 3 เปรียบเทียบรายละเอียดของแหล่งความเครียดของบิดาหรือมารดา และ
คู่สมรส หรือ พี่-น้อง หรือบุตร
- ตอนที่ 4 เปรียบเทียบรายละเอียดของแหล่งความเครียดของญาติผู้ป่วยโรคจิตเภท ที่มี
ภูมิลำเนาต่างกัน
- ตอนที่ 5 เปรียบเทียบรายละเอียดของแหล่งความเครียดของญาติผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มี
ระดับการศึกษาต่างกัน
- ตอนที่ 6 เปรียบเทียบรายละเอียดของแหล่งความเครียดของญาติผู้ป่วยโรคจิตเภท
ชายและหญิง
- ตอนที่ 7 วิเคราะห์ความแปรปรวนของรายละเอียดของแหล่งความเครียดของญาติ
ผู้ป่วยโรคจิตเภทที่ป่วยมาแล้ว เป็นระยะเวลาสั้นแตกต่างกัน

สัญลักษณ์ที่ใช้แทนความหมายต่าง ๆ

เพื่อความสะดวกและเข้าใจผลการวิจัยตรงกัน ผู้วิจัยใช้สัญลักษณ์แทนความหมาย
ต่าง ๆ ดังนี้

\bar{X}	หมายถึง	คะแนนเฉลี่ย
S.D.	หมายถึง	ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
N	หมายถึง	จำนวนตัวอย่างประชากร
t.	หมายถึง	ค่าทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างตัวแปรสองตัว เพื่อ พิจารณาเปรียบเทียบค่ามาตรฐานจากตาราง

SS	หมายถึง	ค่าผลบวกของส่วนเบี่ยงเบนยกกำลังสอง
df	หมายถึง	ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom)
MS	หมายถึง	ส่วนเบี่ยงเบนยกกำลังสองเฉลี่ย (Mean Square)
F	หมายถึง	ค่าทดสอบความแตกต่างระหว่างตัวแปรหลายตัวแปร เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานจากตาราง

เกณฑ์ในการพิจารณาระดับความเครียด

ผู้วิจัยได้ตั้งเกณฑ์ในการพิจารณาระดับความเครียดดังนี้คือ

คะแนนเฉลี่ย	3.00 - 4.00	เครียดมาก
	2.00 - 2.99	เครียดปานกลาง
	1.00 - 1.99	เครียดน้อย

ตอนที่ 1 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่างประชากร

ตารางที่ 1 ญาติผู้ป่วยโรคจิตเภทจำแนกตามระดับการศึกษา

การศึกษา	จำนวน	ร้อยละ
ไม่ได้เรียน - ประถมศึกษาปีที่ 6	83	67.17
มัธยมปีที่ 1 - มัธยมปีที่ 6	23	19.17
อนุปริญญาหรือปริญญาศรีขึ้นไป	14	11.66
รวม	120	100.00

จากตารางที่ 1 ปรากฏว่าญาติผู้ป่วยโรคจิตเภทส่วนใหญ่ (ประมาณร้อยละ 67) ได้รับการศึกษาระดับไม่ได้เรียนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีเป็นส่วนน้อยที่ได้รับการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือปริญญาศรีขึ้นไป

ตารางที่ 2 ญาติผู้ป่วยโรคจิตเภทจำแนกตามความสัมพันธ์กับผู้ป่วย

ความสัมพันธ์กับผู้ป่วย	จำนวน	ร้อยละ
บิดาหรือมารดา	60	50.00
คุสมรส	13	10.83
พี่ - น้อง	33	27.50
บุตร	14	11.67
รวม	120	100.00

จากตารางที่ 2 จะเห็นว่า กลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นบิดาหรือมารดาของผู้ป่วย มีจำนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาเป็น พี่-น้องของผู้ป่วย มีประมาณร้อยละ 28 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่เป็นคุสมรส มีจำนวนพอ ๆ กับบุตรของผู้ป่วย คือมีกลุ่มละประมาณร้อยละ 11

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 3 ญาติของผู้ป่วยโรคจิตเภทจำแนกตามระดับการศึกษาของกลุ่มญาติ

ระดับการศึกษา กลุ่มญาติของผู้ป่วย	ไม่ได้เรียน ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6		มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ปริญญาตรีขึ้นไป		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
	บิดาหรือมารดา	47	78.33	13	21.67	60
คู่สมรส หรือพี่-น้อง หรือบุตร	36	60.00	24	40.00	60	100.00

จากตารางที่ 2 จะเห็นว่า บิดาหรือมารดาของผู้ป่วย ประมาณร้อยละ 78 มีการศึกษาระดับ ไม่ได้เรียนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 และมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปริญญาตรีขึ้นไป เพียงประมาณร้อยละ 22 ส่วนคู่สมรส หรือพี่-น้อง หรือบุตรของผู้ป่วย มีการศึกษาระดับไม่ได้เรียนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน ร้อยละ 60 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปริญญาตรีขึ้นไป จำนวนร้อยละ 40

ตารางที่ 4 ญาติผู้ป่วยโรคจิตเภทจำแนกตามภูมิลำเนา

ภูมิลำเนา	จำนวน	ร้อยละ
ชนบท	62	51.67
เมือง	58	48.33
รวม	120	100.00

จากตารางที่ 3 จะเห็นว่า ญาติผู้ป่วยโรคจิตเภท ประมาณร้อยละ 52 มีภูมิลำเนาในชนบท อีกประมาณร้อยละ 48 มีภูมิลำเนาในเมือง

ตารางที่ 5 ญาติผู้ป่วยโรคจิตเภทจำแนกตามความเป็นญาติของผู้ป่วยโรคจิตเภทเพศชาย และหญิง

เพศของผู้ป่วยโรคจิตเภท	ญาติของผู้ป่วย	
	จำนวน	ร้อยละ
ชาย	66	55.00
หญิง	54	45.00
รวม	120	100.00

จากตารางที่ 5 ปรากฏว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 55 เป็นญาติของผู้ป่วยโรคจิตเภทชาย อีกร้อยละ 45 เป็นญาติของผู้ป่วยโรคจิตเภทหญิง

ตารางที่ 6 ญาติผู้ป่วยโรคจิตเภท จำแนกตามความเป็นญาติของผู้ป่วยโรคจิตเภท ที่ป่วยมาแล้ว เป็นระยะเวลาานานแตกต่างกัน

ระยะเวลาการเจ็บป่วยของผู้ป่วย (ปี)	ญาติของผู้ป่วย	
	จำนวน	ร้อยละ
1 - 5	39	32.50
5.1 - 10	38	31.67
10 ปีขึ้นไป	43	35.83
รวม	120	100.00

จากตารางที่ 6 จะเห็นว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นญาติของผู้ป่วยที่ป่วยมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 - 5 ปี มีจำนวนพอ ๆ กับญาติผู้ป่วยที่ป่วยมาแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปีกว่า - 10 ปีขึ้นไป คือกลุ่มละประมาณร้อยละ 32 ส่วนญาติของผู้ป่วยที่ป่วยมาแล้ว 10 ปีขึ้นไป มีจำนวนประมาณร้อยละ 36

ตอนที่ 2 รายละเอียดของแหล่งความเครียดของญาติผู้ป่วยโรคจิตเภท

ตารางที่ 7 รายละเอียดของแหล่งความเครียดของญาติผู้ป่วยโรคจิตเภท

แหล่งความเครียด	\bar{X}	S.D.
1. ความกังวล		
1.1 ไม่สามารถรักษาผู้ป่วยให้หายดีดั้งเดิม	3.00	1.05
1.2 กังวลว่าในอนาคตผู้ป่วยจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไร	2.91	1.17
1.3 ไม่ทราบว่าใครจะดูแลผู้ป่วย ถ้าท่านต้องเสียชีวิตไป	2.82	1.19
1.4 ห่วงใยในอนาคตของคนอื่น ๆ ในครอบครัว ในฐานะเป็นญาติที่ใกล้ชิดของผู้ป่วยโรคจิต	1.86	1.12
1.5 ห่วงใยอนาคตของตนเองในฐานะเป็นญาติที่ ใกล้ชิดของผู้ป่วยโรคจิต	1.85	1.14
2. สัมพันธภาพภายในครอบครัว		
2.1 ผู้ป่วยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำหรือคำบอกกล่าว ของท่าน	2.24	1.18
2.2 สมาชิกบางคนในครอบครัวมีสีหน้า ท่าทาง คำพูด ที่ไม่ดีต่อผู้ป่วย	2.11	1.22
2.3 ผู้ป่วยมีสีหน้า ท่าทาง หรือคำพูดที่ไม่เป็นมิตร	2.05	1.19
2.4 ผู้ป่วยมักโต้เถียงท่านอยู่เสมอ	1.90	1.16
2.5 ผู้ป่วยไม่ให้ความสำคัญที่ท่านได้ดูแลเอาใจใส่เขา	1.86	1.07
2.6 ผู้ป่วยและสมาชิกในครอบครัวมีการทะเลาะ เบาะแว้งกันอยู่เสมอ	1.82	1.16
2.7 ผู้ป่วยไม่พูดคุยเมื่อท่านสนทนาด้วย	1.71	1.02

ตารางที่ 7 รายละเอียดของแหล่งความเครียดของญาติผู้ป่วยโรคจิตเภท (ต่อ)

แหล่งความเครียด	\bar{X}	S.D.
2.8 ผู้ป่วยหลบหน้าไม่ยอมกู่ไกลท่าน	1.47	0.87
2.9 สมาชิกในครอบครัว ต่างให้ความเอาใจใส่ผู้ป่วย จนไม่ได้สนใจท่าน	1.00	0.00
3. <u>เศรษฐกิจ</u>		
3.1 ต้องเสียเงินค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูผู้ป่วยที่บ้าน	1.96	1.12
3.2 ขาดรายได้จากการประกอบอาชีพของผู้ป่วย	1.93	1.13
3.3 ต้องเสียค่าเดินทางแพงในการพาผู้ป่วยมาพบแพทย์ หรือมารักษา	1.84	1.09
3.4 ต้องเสียเงินค่าใช้จ่ายสูงในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาที่ป่วย	1.78	1.06
3.5 ผู้ป่วยใช้จ่ายสุรุยสุราย	1.69	1.06
4. <u>พฤติกรรมที่เป็นปัญหา</u>		
4.1 ผู้ป่วยกลางคืนไม่นอน มีพฤติกรรมรบกวนคนอื่น ๆ	2.57	1.28
4.2 ผู้ป่วยแสดงออกว่ามีความคิดหลงผิดต่าง ๆ	2.00	1.23
4.3 ผู้ป่วยมีปัญหาเรื่องรับประทานยา	1.99	1.24
4.4 ผู้ป่วยแสดงออกว่าได้ยินเสียงคนมาพูด โดยไม่มีคนพูดอยู่ด้วย	1.93	1.17
4.5 ผู้ป่วยทำลายสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ	1.84	1.21
4.6 ผู้ป่วยไม่คอยพูด	1.83	1.11
4.7 ผู้ป่วยหนีออกจากบ้าน เร่รอนไปตามสถานที่ต่าง ๆ	1.71	1.20
4.8 ผู้ป่วยมักอยู่คนเดียว	1.69	1.09

ตารางที่ 7 รายละเอียดของแหล่งความเครียดของญาติผู้ป่วยโรคจิตเภท (ต่อ)

แหล่งความเครียด	\bar{X}	S.D.
4.9 ผู้ป่วยทำร้ายร่างกายผู้อื่น	1.66	1.16
4.10 ผู้ป่วยไม่ช่วยทำงานบ้าน	1.56	0.56
4.11 ผู้ป่วยพยายามฆ่าตัวตาย	1.34	0.90
4.12 ผู้ป่วยทำงานชามาก	1.33	0.76
4.13 ผู้ป่วยไม่สามารถทำกิจกรรมประจำวันด้วยตนเอง ได้ ต้องคอยช่วยเหลือ	1.22	0.60
5. <u>ชีวิตสังคมและส่วนตัว</u>		
5.1 ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะไปร่วมกิจกรรมทางสังคม ได้ดังแต่ก่อน เนื่องจากต้องดูแลผู้ป่วย	2.22	1.10
5.2 ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะทำกิจกรรมส่วนตัวได้ตามที่ ต้องการ เนื่องจากต้องดูแลผู้ป่วย	2.06	1.15
5.3 ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะทำงานอดิเรกได้ตามที่ ต้องการ เนื่องจากต้องดูแลผู้ป่วย	1.84	1.12
5.4 ญาติอื่น ๆ แสดงท่าทีรังเกียจ ไม่ยอมรับทาน	1.51	0.94
5.5 ไม่กล้าเชิญผู้อื่นมาที่บ้านเนื่องจากความอับอาย ที่มีผู้ป่วยอยู่ที่บ้าน	1.47	0.94
5.6 ไม่กล้าเผชิญหน้ากับเพื่อนหรือบุคคลอื่น เนื่องจาก ความอับอาย	1.43	0.88
5.7 เพื่อนแสดงท่าทีรังเกียจ ไม่ยอมรับทาน	1.42	0.85

ตารางที่ 7 รายละเอียดของแหล่งความเครียดของญาติผู้ป่วยโรคจิตเภท (ต่อ)

แหล่งความเครียด	\bar{X}	S.D.
6. ความอับอาย		
6.1 น้าอับอายที่ผู้ป่วยแสดงพฤติกรรมแปลก ๆ ต่อหน้าผู้อื่นขณะที่ท่านอยู่ด้วย	2.15	1.14
6.2 คิดว่าการมีญาติป่วยเป็นโรคจิต ทำให้ผู้อื่นมองว่า ตระกูลมีความผิดปกติ	1.82	1.08
6.3 น้าอับอายที่คนอื่นเห็นร่างกายผู้ป่วยสกปรกและ มีกลิ่นเหม็นขณะที่ท่านอยู่ด้วย	1.57	0.98
6.4 คิดว่าการมีญาติป่วยด้วยโรคจิตเป็นเรื่องน้าอับอาย	1.53	0.94
6.5 คิดว่าการมีญาติป่วยด้วยโรคจิต ทำให้เสียชื่อเสียง เกียรติยศ	1.53	0.94
6.6 น้าอับอายที่จะพาผู้ป่วยไปรับการรักษาที่ โรงพยาบาลโรคจิต	1.31	0.74
7. ความรู้สึกผิด		
7.1 คิดว่าที่ผ่านมาบางครั้งท่านใช้อารมณ์กับผู้ป่วย มากเกินไป	1.94	1.08
7.2 คิดว่าผู้ป่วยคงไม่ป่วยเป็นโรคจิต ถ้าท่านได้รีบพา ไปรักษาตั้งแต่เริ่มมีอาการผิดปกติ	1.71	1.14
7.3 คิดว่าที่ผ่านมาท่านไม่ได้ให้ความช่วยเหลือ ประคับประคองผู้ป่วยอย่างเต็มที่	1.60	0.99
7.4 คิดว่าการเลี้ยงดู หรือการปฏิบัติของท่านต่อผู้ป่วย มีส่วนทำให้ผู้ป่วยป่วยเป็นโรคจิต	1.33	0.76

ตารางที่ 7 รายละเอียดของแหล่งความเครียดของญาติผู้ป่วยโรคจิตเภท (ต่อ)

แหล่งความเครียด	\bar{X}	S.D.
8. ระบบบริการทางสุขภาพจิต		
8.1 เวลาผู้ป่วยมีอาการเกิดขึ้นอย่างฉุกเฉิน ต้องเดินทางไกลเพื่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน	1.91	1.22
8.2 ไม่ทราบขั้นตอนของการขอรับบริการ	1.57	0.91
8.3 บริการนอกเวลาราชการไม่สะดวก	1.49	0.97
8.4 การให้บริการที่โรงพยาบาลล่าช้า	1.47	0.88
8.5 บริการในวันหยุดราชการไม่สะดวก	1.45	0.91
8.6 ทางโรงพยาบาลจำหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลเร็วเกินไป ขณะที่อาการผู้ป่วยยังไม่ทุเลา	1.45	0.91
8.7 หน่วยงานของรัฐไม่ได้ช่วยดูแลผู้ป่วยเท่าที่ควร	1.45	0.92
8.8 ไม่รู้จักหน่วยงานทางสุขภาพจิตที่อยู่ใกล้บ้านว่ามีที่ไยบ้าง	1.45	0.92
8.9 หน่วยงานไม่มีการให้ความรู้แก่ญาติเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน	1.27	0.63
8.10 ทางโรงพยาบาลดูแลผู้ป่วยไม่ทั่วถึง เป็นเหตุให้ผู้ป่วยหลบหนีออกจากโรงพยาบาลก่อนที่จะมีอาการทุเลาพอที่จะอยู่ที่บ้านได้	1.27	0.80
8.11 หน่วยงานของรัฐไม่ได้ฝึกอาชีพให้ผู้ป่วย	1.26	0.67

ตารางที่ 7 รายละเอียดของแหล่งความเครียดของญาติผู้ป่วยโรคจิตเภท (ต่อ)

แหล่งความเครียด	\bar{X}	S.D.
9. พฤติกรรมทางเพศของผู้ป่วย		
9.1 ท่านกลัวว่าผู้ป่วยจะถูกหลอกหลวงเรื่องเพศ	1.76	1.20
9.2 ท่านกลัวว่าผู้ป่วยจะตั้งครรภ์นอกสมรส	1.53	1.08
9.3 ผู้ป่วยแสดงความสนใจเพศตรงข้ามออกมาอย่างไม่เหมาะสม	1.33	0.82
9.4 ผู้ป่วยมีความต้องการทางเพศมากขึ้น	1.17	0.64
9.5 ผู้ป่วยมีความต้องการทางเพศน้อยลง	1.01	0.09
10. การติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่		
10.1 เจ้าหน้าที่ตอบคำถามไม่กระจ่างชัด	1.18	0.53
10.2 เจ้าหน้าที่ที่ไปติดต่อกวามีสีหน้าและท่าทางไม่เป็นมิตร	1.18	0.55
10.3 เจ้าหน้าที่ไม่เปิดโอกาสให้ท่านซักถามข้อข้องใจ	1.18	0.59
10.4 เจ้าหน้าที่พูดเป็นเชิงตำหนิตานหรือญาติ ๆ เป็นผู้ทำให้ผู้ป่วยเกิดการป่วยซ้ำ	1.13	0.55
10.5 แพทย์และ/หรือพยาบาลไม่รับฟังข้อสังเกตของท่านเกี่ยวกับอาการของผู้ป่วย	1.11	0.48
10.6 การซักถามซ้ำ ๆ เกี่ยวกับประวัติความเจ็บป่วยของผู้ป่วยจากเจ้าหน้าที่หลายคน	1.07	0.34

ตารางที่ 7 รายละเอียดของแหล่งความเครียดของญาติผู้ป่วยโรคจิตเภท (ต่อ)

แหล่งความเครียด	\bar{X}	S.D.
10.7 เจ้าหน้าที่ผู้เป็นเชิงตำหนิว่าท่านหรือญาติ ๆ เป็นผู้ทำให้ผู้ป่วยเป็นโรคจิต	1.05	0.29

หมายเหตุ : เครียดมาก \bar{X} = 3.00-4.00
 เครียดปานกลาง \bar{X} = 2.00-2.99
 เครียดน้อย \bar{X} = 1.00-1.99

จากตารางที่ 7 จะเห็นว่า ญาติผู้ป่วยโรคจิตเภทมีคะแนนเฉลี่ยความเครียดระดับสูง 1 ข้อ ด้านความกังวลว่า "ไม่สามารถรักษาผู้ป่วยให้หายดีดั้งเดิม" คะแนนเฉลี่ยความเครียดระดับปานกลาง 10 ข้อ ดังนี้ ด้านความกังวล 2 ข้อ คือ "กังวลว่าในอนาคตผู้ป่วยจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไร" และ "ไม่ทราบว่าใครจะดูแลผู้ป่วย ถ้าญาติต้องเสียชีวิตไป" ด้านสัมพันธภาพในครอบครัว 3 ข้อ คือ "ผู้ป่วยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำหรือคำบอกกล่าวของญาติ" "สมาชิกบางคนในครอบครัวมีสีหน้า ท่าทาง คำพูดที่ไม่ดีต่อผู้ป่วย" และ "ผู้ป่วยมีสีหน้า ท่าทาง หรือคำพูดที่ไม่เป็นมิตร" ด้านพฤติกรรมที่เป็นปัญหา 2 ข้อ คือ "ผู้ป่วยกลางคืนไม่นอน มีพฤติกรรมรบกวนคนอื่น ๆ " และ "ผู้ป่วยแสดงออกว่ามีความคิดหลงผิดต่าง ๆ " ด้านชีวิตสังคมและส่วนตัว 2 ข้อ คือ "ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะไปร่วมกิจกรรมทางสังคมได้ดังแต่ก่อน เนื่องจากต้องดูแลผู้ป่วย" และ "ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะทำกิจกรรมส่วนตัวได้ตามที่ต้องการ เนื่องจากต้องดูแลผู้ป่วย" ด้านความอับอาย 1 ข้อ คือ "นอ้าอ่ายที่ผู้ป่วยแสดงพฤติกรรมแปลก ๆ ต่อหน้าผู้อื่น ขณะที่ญาติอยู่ด้วย"

ตอนที่ 3 เปรียบเทียบรายละเอียดของแหล่งความเครียดของบิดาหรือมารดา และคุณสมรส หรือ พี่-น้อง หรือบุตร

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบรายละเอียดของแหล่งความเครียดของบิดาหรือมารดา และคุณสมรส หรือพี่-น้อง หรือบุตร

แหล่งความเครียด	บิดาหรือมารดา N = 60		คุณสมรส หรือ พี่-น้องหรือบุตร N = 60		t
	\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.	
	ก. <u>ด้านเศรษฐกิจ</u>				
1. ขาดรายได้จากการประกอบอาชีพของผู้ป่วย	2.08	1.12	1.78	1.12	1.46
2. ต้องเสียเงินค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูผู้ป่วยที่บ้าน	2.08	1.12	1.83	1.11	1.23
3. ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ป่วย	1.88	1.12	1.67	.99	1.12
4. ต้องเสียค่าเดินทางแพงในการพาผู้ป่วยมาพบ แพทย์หรือมารักษา	1.83	1.08	1.85	1.12	-.08
5. ผู้ป่วยใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย	1.58	.98	1.80	1.13	-1.12
ข. <u>ด้านชีวิตสังคมและส่วนตัว</u>					
6. ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะไปร่วมกิจกรรมทางสังคม ได้ดังแต่ก่อน เนื่องจากต้องดูแลผู้ป่วย	2.30	1.09	2.13	1.11	.83
7. เพื่อนแสดงท่าทีรังเกียจ ไม่ยอมรับท่าน	1.50	.91	1.33	.77	1.08
8. คนอื่น ๆ แสดงท่าทีรังเกียจ ไม่ยอมรับท่าน	1.42	.87	1.60	1.01	-1.06
9. ไม่กล้าเผชิญหน้ากับเพื่อนหรือบุคคลอื่น เนื่องจาก ความอับอาย	1.52	.93	1.35	.82	1.04

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบรายละเอียดของแหล่งความเครียดของบิดาหรือมารดา และคู่สมรส หรือพี่-น้อง หรือบุตร (ต่อ)

แหล่งความเครียด	บิดาหรือมารดา		คู่สมรส หรือ พี่-น้องหรือบุตร		t
	N = 60		N = 60		
	\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.	
10. ไม่กล้าเชิญผู้เฒ่ามาที่บ้านเนื่องจากความอับอายที่มีผู้ป่วยอยู่ที่บ้าน	1.55	1.02	1.38	.87	.97
11. ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะทำกิจกรรมส่วนตัวได้ตามที่ต้องการ เนื่องจากต้องดูแลผู้ป่วย	2.22	1.24	1.90	1.04	1.52
12. ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะทำงานอดิเรกได้ตามที่ต้องการ เนื่องจากต้องดูแลผู้ป่วย	1.97	1.19	1.72	1.03	1.23
ค. <u>ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว</u>					
13. สมาชิกบางคนในครอบครัวมีสีหน้า ท่าทาง คำพูด ที่ไม่คิดต่อผู้ป่วย	2.20	1.30	2.02	1.14	.82
14. ผู้ป่วยไม่พูดคุยเมื่อท่านสนทนาด้วย	1.85	1.09	1.57	.93	1.54
15. ผู้ป่วยไม่ให้ความสำคัญที่ท่านได้ดูแลเอาใจใส่เขา	1.98	1.16	1.73	.97	1.28
16. ผู้ป่วยหลบหน้าไม่ยอมอยู่ใกล้ท่าน	1.62	.98	1.33	.73	1.80
17. ผู้ป่วยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำหรือคำบอกกล่าวของท่าน	2.20	1.18	2.28	1.20	-.39
18. ผู้ป่วยมักโต้เถียงท่านอยู่เสมอ	1.97	1.21	1.83	1.12	.63
19. ผู้ป่วยมีสีหน้า ท่าทาง หรือคำพูด ที่ไม่เป็นมิตร	2.02	1.20	2.08	1.18	-.31
20. สมาชิกในครอบครัว ค้างให้ความเอาใจใส่ผู้ป่วยจนไม่ใส่ใจท่าน	1.00	0.00	1.00	-	-

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบรายละเอียดของแหล่งความเครียดของบิดาหรือมารดา และคุณสมรส หรือพี่-น้อง หรือบุตร (ต่อ)

แหล่งความเครียด	บิดาหรือมารดา N = 60		คุณสมรส หรือ พี่-น้องหรือบุตร N = 60		t
	\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.	
21. ผู้ป่วยและสมาชิกในครอบครัวมีการทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่เสมอ ง. <u>ความอับอาย</u>	1.83	1.18	1.82	1.14	.08
22. คิดว่าการมีญาติป่วยด้วยโรคจิตเป็นเรื่องน่าอับอาย	1.62	.99	1.43	.89	1.06
23. คิดว่าการมีญาติป่วยเป็นโรคจิต ทำให้เสียชื่อเสียงเกียรติยศ	1.67	1.05	1.40	.81	1.56
24. คิดว่าการมีญาติป่วยเป็นโรคจิต ทำให้ผู้อื่นมองว่าตระกูลมีความผิดปกติ	1.87	1.13	1.78	1.04	.42
25. น่าอับอายที่ผู้ป่วยแสดงพฤติกรรมแปลก ๆ ต่อหน้าผู้อื่นขณะที่ทานอยู่ด้วย	2.10	1.12	2.20	1.18	-.48
26. น่าอับอายที่คนอื่นเห็นร่างกายผู้ป่วยสกปรกและมีกลิ่นเหม็นขณะที่ทานอยู่ด้วย	1.67	1.05	1.47	.89	1.12
27. น่าอับอายที่จะพาผู้ป่วยไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลโรคจิต	1.37	.82	1.25	.65	.86
จ. <u>ความรู้สึกผิด</u>					
28. คิดว่าการเลี้ยงดูหรือการปฏิบัติของท่านต่อผู้ป่วยมีส่วนทำให้ผู้ป่วยป่วยเป็นโรคจิต	1.50	.93	1.17	.49	2.45*

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบรายละเอียดของแหล่งความเครียดของบิดาหรือมารดา และคุณสมรส หรือพี่-น้อง หรือบุตร (ต่อ)

แหล่งความเครียด	บิดาหรือมารดา		คุณสมรส หรือ พี่-น้องหรือบุตร		t
	N = 60		N = 60		
	\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.	
29. คิดว่าผู้ป่วยคงไม่ป่วยเป็นโรคจิต ถ้าท่านได้รับพาไปรักษาตั้งแต่เริ่มมีอาการผิดปกติ	1.65	1.13	1.77	1.16	-.56
30. คิดว่าที่ผ่านมาท่านไม่ได้ให้ความช่วยเหลือ ประคับประคองผู้ป่วยอย่างเต็มที่	1.62	.99	1.58	1.00	.18
31. คิดว่าที่ผ่านมาบางครั้งท่านใช้อารมณ์กับผู้ป่วยมากเกินไป	1.73	1.01	2.15	1.12	-2.15*
จ. <u>ความกังวล</u>					
32. กังวลว่าในอนาคตผู้ป่วยจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไร	3.10	1.12	2.72	1.20	1.82
33. ห่วงใยอนาคตของตนเองในฐานะเป็นญาติที่ใกล้ชิดของผู้ป่วยโรคจิต	1.83	1.12	1.87	1.17	-.16
34. ห่วงใยอนาคตของคนอื่น ๆ ในครอบครัวในฐานะเป็นญาติที่ใกล้ชิดของผู้ป่วยโรคจิต	1.83	1.12	1.88	1.14	-.24
35. ไม่ทราบว่าใครจะดูแลผู้ป่วย ถ้าท่านต้องเสียชีวิตไป	2.95	1.19	2.68	1.19	1.23
36. ไม่สามารถรักษาสภาพผู้ป่วยให้หายดีดั้งเดิม	3.03	1.06	2.97	1.06	.35

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบรายละเอียดของแหล่งความเครียดของบิดาหรือมารดา และคุณสมรส หรือพี่-น้อง หรือบุตร (ต่อ)

แหล่งความเครียด	บิดาหรือมารดา		คุณสมรส หรือ พี่-น้องหรือบุตร		t
	N = 60		N = 60		
	\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.	
ข. พฤติกรรมทางเพศของผู้ป่วย					
37. ผู้ป่วยมีความต้องการทางเพศมากขึ้น	1.17	.59	1.18	.70	-.14
38. ผู้ป่วยมีความต้องการทางเพศน้อยลง	1.02	.13	1.00	.00	-
39. ผู้ป่วยแสดงความสนใจเพศตรงข้ามออกมา อย่างไม่เหมาะสม	1.22	.67	1.43	.95	-1.45
40. ท่านกลัวว่าผู้ป่วยจะถูกหลอกหลวงเรื่องเพศ	1.90	1.30	1.62	1.09	1.29
41. ท่านกลัวว่าผู้ป่วยจะตั้งครรรณ์นอกสมรส	1.58	1.14	1.48	1.03	.50
ข. พฤติกรรมที่เป็นปัญหา					
42. ผู้ป่วยไม่ค่อยพูด	2.02	1.13	1.63	1.07	1.91
43. ผู้ป่วยมักอยู่คนเดียว	1.70	1.05	1.68	1.14	.08
44. ผู้ป่วยไม่ช่วยทำงานบ้าน	1.75	1.05	1.37	.80	2.25*
45. ผู้ป่วยทำงานชามาก	1.18	.57	1.47	.89	-2.08*
46. ผู้ป่วยไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันด้วยตนเอง ได้ ต้องคอยช่วยเหลือ	1.13	.43	1.30	.72	-1.54
47. ผู้ป่วยมีปัญหาเรื่องการรับประทานยา	1.82	1.19	2.17	1.28	-1.56
48. ผู้ป่วยกลางคืนไม่นอน มีพฤติกรรมรบกวนคนอื่น ๆ	2.45	1.28	2.68	1.28	-1.00
49. ผู้ป่วยหนีออกจากบ้าน เรรอนไปตามสถานที่ต่าง ๆ	1.72	1.28	1.70	1.12	.08
50. ผู้ป่วยทำร้ายร่างกายผู้อื่น	1.67	1.18	1.65	1.15	.08
51. ผู้ป่วยทำลายสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ	1.90	1.20	1.78	1.22	.53

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบรายละเอียดของแหล่งความเครียดของบิกาหรือมารดา และคู่สมรส หรือพี่-น้อง หรือบุตร (ต่อ)

แหล่งความเครียด	บิกาหรือมารดา		คู่สมรส หรือ พี่-น้องหรือบุตร		t
	N = 60		N = 60		
	\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.	
52. ผู้ป่วยแสดงออกว่ามีความคิดหลงผิดต่าง ๆ	1.78	1.20	2.22	1.24	-1.95
53. ผู้ป่วยแสดงออกว่าได้ยินเสียงคนมาพูด โดยไม่มีคนพูดอยู่ด้วย	1.88	1.21	1.97	1.13	-.39
54. ผู้ป่วยพยายามฆ่าตัวตาย	1.47	1.03	1.22	.74	1.53
ฉ. การติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่					
55. เจ้าหน้าที่ที่ไปติดต่อควรมีสีหน้าและท่าทางไม่เป็นมิตร	1.12	.45	1.25	.63	-1.33
56. เจ้าหน้าที่ไม่เปิดโอกาสให้ท่านซักถามข้อสงสัย	1.20	.63	1.17	.56	.31
57. เจ้าหน้าที่ตอบคำถามไม่กระจ่างชัด	1.12	.42	1.23	.62	-1.21
58. การซักถามซ้ำ ๆ เกี่ยวกับประวัติความเจ็บป่วยของผู้ป่วยจากเจ้าหน้าที่หลายคน	1.05	.22	1.08	.42	-.54
59. เจ้าหน้าที่พูดเป็นเชิงตำหนิตานหรือญาติ ๆ เป็นผู้ทำให้ผู้ป่วยเป็นโรคจิต	1.07	.36	1.03	.18	.64
60. เจ้าหน้าที่พูดเป็นเชิงตำหนิตานหรือญาติ ๆ เป็นผู้ทำให้ผู้ป่วยเกิดการป่วยซ้ำ	1.10	.54	1.17	.56	-.66
61. แพทย์และ/หรือพยาบาลไม่รับฟังข้อสังเกตของท่านเกี่ยวกับอาการของผู้ป่วย	1.10	.48	1.12	.49	-.19

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบรายละเอียดของแหล่งความเครียดของบิดาหรือมารดา และคู่สมรส หรือพี่-น้อง หรือบุตร (ต่อ)

แหล่งความเครียด	บิดาหรือมารดา N = 60		คู่สมรส หรือ พี่-น้องหรือบุตร N = 60		t
	\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.	
ญ. ระบบบริการทางสุขภาพจิต					
62. หน่วยงานของรัฐไม่ให้คุณดูแลผู้ป่วยเท่าที่ควร	1.30	.81	1.60	1.01	-1.79
63. หน่วยงานของรัฐไม่ได้ฝึกอาชีพให้ผู้ป่วย	1.30	.67	1.22	.67	.68
64. หน่วยงานไม่มีการให้ความรู้แก่ญาติ เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน	1.20	.55	1.33	.71	-1.16
65. เวลาผู้ป่วยมีอาการ เกิดขึ้นอย่างฉุกเฉิน ต้องเดินทางไกล เพื่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน	1.85	1.17	1.97	1.26	-.52
66. ไม่รู้จักหน่วยงานทางสุขภาพจิตที่อยู่ใกล้บ้านว่ามีที่ใดบ้าง	1.40	.89	1.50	.95	-.60
67. บริการนอกเวลาราชการไม่สะดวก	1.42	.89	1.57	1.05	-.85
68. บริการในวันหยุดราชการไม่สะดวก	1.38	.85	1.52	.97	-.80
69. ไม่ทราบขั้นตอนของการขอรับบริการ	1.57	.89	1.57	.95	.00
70. ทางโรงพยาบาลดูแลผู้ป่วยไม่ทั่วถึง เป็นเหตุให้ผู้ป่วยหลบหนีออกจากโรงพยาบาลก่อนที่จะมีอาการทุเลาพอที่จะอยู่ที่บ้านได้	1.37	.90	1.17	.67	1.38

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบรายละเอียดของความเครียดของบิดาหรือมารดา และคุณสมรส หรือพี่-น้อง หรือบุตร (ต่อ)

แหล่งความเครียด	บิดาหรือมารดา N = 60		คุณสมรส หรือ พี่-น้องหรือบุตร N = 60		t
	\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.	
71. ทางโรงพยาบาลจำหน่ายผู้ป่วยออกจาก โรงพยาบาลเร็วเกินไป ขณะที่อาการผู้ป่วย ยังไม่ทุเลา	1.32	.73	1.58	1.05	-1.62
72. การให้บริการที่โรงพยาบาลล่าช้า	1.27	.69	1.67	1.00	-2.55*

* $p < .05$

จากตารางที่ 8 แสดงให้เห็นว่า บิดาหรือมารดา และคุณสมรส หรือพี่-น้อง หรือบุตร ของผู้ป่วย มีความเครียดเนื่องจากสถานการณ์ต่าง ๆ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 5 ข้อ โดยที่บิดาหรือมารดา มีคะแนนเฉลี่ยความเครียดสูงกว่าคุณสมรส หรือพี่-น้อง หรือบุตรของผู้ป่วย ในเรื่อง "คิดว่า การเลี้ยงดูหรือการปฏิบัติของญาติต่อผู้ป่วย ทำให้ผู้ป่วยป่วย เป็นโรคจิต" และ "ผู้ป่วยไม่ช่วยทำงานบ้าน" ส่วนคุณสมรส หรือพี่-น้อง หรือบุตรของผู้ป่วย มีคะแนนเฉลี่ยความเครียดสูงกว่าบิดาหรือมารดาของผู้ป่วย ในเรื่อง "คิดว่าที่ผ่านมามีครั้ง ญาติใช้อารมณ์กับผู้ป่วยมากเกินไป" "ผู้ป่วยทำงานชามาก" และ "การให้บริการที่ โรงพยาบาลล่าช้า"

ตอนที่ 4 เปรียบเทียบรายละเอียดของแหล่งความเครียดของญาติผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีภูมิลำเนา
ในชนบทและเมือง

ตารางที่ 9 รายละเอียดของแหล่งความเครียดของญาติผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน
ชนบทและเมือง

แหล่งความเครียด	ชนบท N = 62		เมือง N = 58		t
	\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.	
ก. <u>ด้านเศรษฐกิจ</u>					
1. ขาดรายได้จากการประกอบอาชีพของผู้ป่วย	2.18	1.14	1.67	1.07	2.50*
2. ต้องเสียเงินค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูผู้ป่วยที่บ้าน	2.24	1.16	1.66	1.00	2.97*
3. ต้องเสียเงินค่าใช้จ่ายสูงในการรักษาพยาบาล ผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ป่วย	1.98	1.12	1.55	.94	2.28*
4. ต้องเสียค่าเดินทางแพงในการพผู้ป่วยมาพบ แพทย์หรือมารับยา	2.27	1.18	1.38	.77	4.97**
5. ผู้ป่วยใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย	1.81	1.16	1.57	.94	1.23
ข. <u>ด้านชีวิตสังคมและส่วนตัว</u>					
6. ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะไปร่วมกิจกรรมทางสังคม ได้ตั้งแต่ก่อนเนื่องจากต้องดูแลผู้ป่วย	2.31	1.07	2.12	1.14	.92
7. เพื่อนแสดงท่าทีรังเกียจ ไม่ยอมรับท่าน	1.47	.88	1.36	.81	.68
8. ญาติอื่น ๆ แสดงท่าทีรังเกียจ ไม่ยอมรับท่าน	1.69	1.02	1.31	.82	2.26*
9. ไม่กล้าเผชิญหน้ากับเพื่อนหรือบุคคลอื่น เนื่องจาก ความอับอาย	1.56	.95	1.29	.77	1.71

ตารางที่ 9 รายละเอียดของแหล่งความเครียดของญาติผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน
ชนบทและเมือง (ต่อ)

แหล่งความเครียด	ชนบท N = 62		เมือง N = 58		t
	\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.	
10. ไม่กล้าเชิญผู้อื่นมาที่บ้านเนื่องจากความอับอาย ที่มีผู้ป่วยอยู่ที่บ้าน	1.55	1.00	1.38	.88	.98
11. ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะทำกิจกรรมส่วนตัวได้ ตามที่ต้องการ เนื่องจากต้องดูแลผู้ป่วย	2.18	1.11	1.93	1.18	1.18
12. ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะทำงานอดิเรกได้ตามที่ ต้องการ เนื่องจากต้องดูแลผู้ป่วย	1.92	1.09	1.76	1.14	.79
ค. <u>ความสัมพันธ์สภาพภายในครอบครัว</u>					
13. สมาชิกบางคนในครอบครัวมีสีหน้า ท่าทาง คำพูด ที่ไม่ดีต่อผู้ป่วย	2.37	1.30	1.83	1.08	2.49*
14. ผู้ป่วยไม่พูดคุยเมื่อท่านสนทนาด้วย	1.76	1.08	1.66	.95	.55
15. ผู้ป่วยไม่ให้ความสำคัญที่ท่านได้ดูแลเอาใจใส่เขา	2.05	1.11	1.66	1.00	2.04*
16. ผู้ป่วยหลบหน้าไม่ยอมอยู่ใกล้ท่าน	1.53	.88	1.41	.86	.74
17. ผู้ป่วยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำหรือคำบอกกล่าว ของท่าน	2.27	1.22	2.21	1.15	.31
18. ผู้ป่วยมักโต้เถียงท่านอยู่เสมอ	1.94	1.17	1.86	1.16	.34
19. ผู้ป่วยมีสีหน้า ท่าทาง หรือคำพูดที่ไม่เป็นมิตร	2.16	1.20	1.93	1.17	1.06
20. สมาชิกในครอบครัว ต่างให้ความเอาใจใส่ ผู้ป่วยจนไม่ได้สนใจท่าน	1.00	0.00	1.00	-	-

ตารางที่ 9. รายละเอียดของแหล่งความเครียดของญาติผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน
ชนบทและเมือง (ต่อ)

แหล่งความเครียด	ชนบท N = 62		เมือง N = 58		t
	\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.	
21. ผู้ป่วยและสมาชิกในครอบครัวมีการทะเลาะ เบาะแว้งกันอยู่เสมอ	1.92	1.18	1.72	1.14	.92
ง. <u>ความอับอาย</u>					
22. คิดว่าการมีญาติป่วยด้วยโรคจิตเป็นเรื่อง น่าอับอาย	1.63	1.00	1.41	.88	1.25
23. คิดว่าการมีญาติป่วยเป็นโรคจิต ทำให้ เสียชื่อเสียงเกียรติยศ	1.66	.99	1.41	.88	1.35
24. คิดว่าการมีญาติป่วยเป็นโรคจิต ทำให้ผู้อื่น มองว่าตระกูลมีความผิดปกติ	2.11	1.13	1.52	.94	3.12*
25. น้าอับอายที่ผู้ป่วยแสดงพฤติกรรมแปลก ๆ ต่อหน้าผู้อื่นขณะที่ทานอยู่ด้วย	2.27	1.18	2.02	1.10	1.23
26. น้าอับอายที่คนอื่นเห็นร่างกายผู้ป่วยสกปรกและ มีกลิ่นเหม็นขณะที่ทานอยู่ด้วย	1.55	.97	1.59	.99	-.21
27. น้าอับอายที่จะพาผู้ป่วยไปรับการรักษาที่ โรงพยาบาลโรคจิต	1.40	.84	1.21	.61	1.47
จ. <u>ความรู้สึกผิด</u>					
28. คิดว่าการเลี้ยงดูหรือการปฏิบัติของท่านต่อ ผู้ป่วยมีส่วนทำให้ผู้ป่วยป่วยเป็นโรคจิต	1.32	.72	1.34	.81	-.16

ตารางที่ 9 รายละเอียดของแหล่งความเครียดของญาติผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน
ชนบทและเมือง (ต่อ)

แหล่งความเครียด	ชนบท N = 62		เมือง N = 58		t
	\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.	
29. คิดว่าผู้ป่วยคงไม่ป่วยเป็นโรคจิต ถ้าท่านได้ รีบพาไปรักษาตั้งแต่เริ่มมีอาการผิดปกติ	1.71	1.17	1.71	1.12	.01
30. คิดว่าที่ญาติมาหาท่านไม่ได้ให้ความช่วยเหลือ ประคับประคองผู้ป่วยอย่างเต็มที่	1.71	1.03	1.48	.94	1.26
31. คิดว่าที่ญาติมาบางครั้งท่านใช้อารมณ์กับผู้ป่วย มากเกินไป	2.16	1.10	1.71	1.01	2.35*
ด. ความกังวล					
32. กังวลว่าในอนาคตผู้ป่วยจะดำเนินชีวิตต่อไป อย่างไร	3.02	1.09	2.79	1.24	1.05
33. ห่วงใยอนาคตของตนเองในฐานะเป็นญาติ ที่ใกล้ชิดของผู้ป่วยโรคจิต	2.13	1.22	1.55	.98	2.85*
34. ห่วงใยอนาคตของคนอื่น ๆ ในครอบครัว ในฐานะเป็นญาติที่ใกล้ชิดของผู้ป่วยโรคจิต	1.97	1.13	1.74	1.12	1.10
35. ไม่ทราบว่าใครจะดูแลผู้ป่วย ถ้าท่านต้อง เสียชีวิตไป	2.90	1.18	2.72	1.20	.82
36. ไม่สามารถรักษาสภาพผู้ป่วยให้หายดีดังเดิม	3.15	.97	2.84	1.12	1.57

ตารางที่ 9 รายละเอียดของแหล่งความเครียดของญาติผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน
ชนบทและเมือง (ต่อ)

แหล่งความเครียด	ชนบท N = 62		เมือง N = 58		t
	\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.	
ข. พฤติกรรมทางเพศของผู้ป่วย					
37. ผู้ป่วยมีความต้องการทางเพศมากขึ้น	1.23	.73	1.12	.53	.90
38. ผู้ป่วยมีความต้องการทางเพศน้อยลง	1.02	.13	1.00	.00	-
39. ผู้ป่วยแสดงความสนใจเพศตรงข้ามออกมา อย่างไม่เหมาะสม	1.29	.80	1.36	.85	-.48
40. ท่านกลัวว่าผู้ป่วยจะถูกหลอกลวงเรื่องเพศ	1.69	1.17	1.83	1.24	-.61
41. ท่านกลัวว่าผู้ป่วยจะตั้งครรภ์นอกสมรส	1.55	1.10	1.52	1.08	.16
ค. พฤติกรรมที่เป็นปัญหา					
42. ผู้ป่วยไม่คอยพูด	1.84	1.07	1.81	1.16	.14
43. ผู้ป่วยมักอยู่คนเดียว	1.77	1.11	1.60	1.08	.86
44. ผู้ป่วยไม่ช่วยทำงานบ้าน	1.60	.91	1.52	1.00	.46
45. ผู้ป่วยทำงานชามาก	1.40	.84	1.24	.66	1.17
46. ผู้ป่วยไม่สามารถทำกิจกรรมประจำวันด้วยตนเอง ได้ ต้องคอยช่วยเหลือ	1.23	.64	1.21	.55	.17
47. ผู้ป่วยมีปัญหาเรื่องการรับประทานยา	2.10	1.33	1.88	1.14	.96
48. ผู้ป่วยกลางคืนไม่นอน มีพฤติกรรมรบกวนคนอื่น ๆ	2.71	1.29	2.41	1.27	1.27
49. ผู้ป่วยหนีออกจากบ้าน เรรอนไปตามสถานที่ ต่าง ๆ	1.69	1.17	1.72	1.24	-.14

ตารางที่ 9 รายละเอียดของแหล่งความเครียดของญาติผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน
ชนบทและเมือง (ต่อ)

แหล่งความเครียด	ชนบท N = 60		เมือง N = 58		t
	\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.	
	50. ผู้ป่วยทำร้ายร่างกายผู้อื่น	1.90	1.29	1.40	
51. ผู้ป่วยทำลายสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ	2.00	1.26	1.67	1.15	1.49
52. ผู้ป่วยแสดงออกว่ามีความคิดหลงผิดต่าง ๆ	2.27	1.31	1.71	1.08	2.58*
53. ผู้ป่วยแสดงออกว่าไคยีนเสียงคนมาพูด โดย ไม่มีคนพูดอยู่ด้วย	2.05	1.18	1.79	1.15	1.20
54. ผู้ป่วยพยายามฆ่าตัวตาย	1.34	.92	1.34	.89	-.04
ฉ. การติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่					
55. เจ้าหน้าที่ที่ไปติดต่อกับผู้มีสิทธิ์และหาทาง ที่ไม่เป็นมิตร	1.13	.46	1.24	.63	-1.11
56. เจ้าหน้าที่ไม่เปิดโอกาสให้ท่านซักถาม ข้อข้องใจ	1.13	.46	1.24	.71	-1.02
57. เจ้าหน้าที่ตอบคำถามไม่กระจ่างชัด	1.11	.37	1.24	.66	-1.31
58. การซักถามซ้ำ ๆ เกี่ยวกับประวัติความเจ็บป่วย ของผู้ป่วยจากเจ้าหน้าที่หลายคน	1.06	.25	1.07	.41	-.07
59. เจ้าหน้าที่พูดเป็นเชิงตำหนิว่าท่านหรือญาติ ๆ เป็นผู้ทำให้ผู้ป่วยเป็นโรคจิต	1.02	.13	1.09	.39	-1.31
60. เจ้าหน้าที่พูดเป็นเชิงตำหนิว่าท่านหรือญาติ ๆ เป็นผู้ทำให้ผู้ป่วยเกิดการป่วยซ้ำ	1.18	.64	1.09	.43	.92

ตารางที่ 9 รายละเอียดของแหล่งความเครียดของญาติผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน
ชนบทและเมือง (ต่อ)

แหล่งความเครียด	ชนบท N = 60		เมือง N = 58		t
	\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.	
61. แพทย์และ/หรือพยาบาลไม่รับฟังข้อสังเกตของท่านเกี่ยวกับอาการของผู้ป่วย	1.06	.40	1.16	.56	-1.02
ฉ. ระบบบริการทางสุขภาพจิต					
62. หน่วยงานของรัฐไม่ได้ช่วยดูแลผู้ป่วยเท่าที่ควร	1.40	.88	1.50	.98	-.57
63. หน่วยงานของรัฐไม่ได้ฝึกอาชีพให้ผู้ป่วย	1.31	.72	1.21	.61	.82
64. หน่วยงานของรัฐไม่มีการให้ความรู้แก่ญาติเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน	1.27	.66	1.26	.61	.13
65. เวลาผู้ป่วยมีอาการเกิดขึ้นอย่างฉุกเฉิน ต้องเดินทางไกลเพื่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน	2.15	1.32	1.66	1.05	2.24*
66. ไม่รู้จักหน่วยงานทางสุขภาพจิตที่อยู่ใกล้บ้านว่ามีที่ใดบ้าง	1.63	1.06	1.26	.69	2.28*
67. บริการนอกเวลาราชการไม่สะดวก	1.68	1.11	1.29	.75	2.23*
68. บริการในวันหยุดราชการไม่สะดวก	1.56	1.00	1.33	.78	1.44
69. ไม่ทราบขั้นตอนของการขอรับบริการ	1.71	.95	1.41	.86	1.79
70. ทางโรงพยาบาลดูแลผู้ป่วยไม่ทั่วถึง เป็นเหตุให้ผู้ป่วยหลบหนีออกจากโรงพยาบาลก่อนที่จะมีอาการทุเลาพอที่จะอยู่ที่บ้านได้	1.26	.79	1.28	.81	-.12

ตารางที่ 9 รายละเอียดของแหล่งความเครียดของญาติผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน
ชนบทและเมือง (ต่อ)

แหล่งความเครียด	ชนบท N = 62		เมือง N = 58		t
	\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.	
71. ทางโรงพยาบาลจำหน่ายผู้ป่วยออกจาก โรงพยาบาลเร็วเกินไป ขณะที่อาการผู้ป่วย ยังไม่ทุเลา	1.56	1.00	1.33	.78	1.44
72. การให้บริการที่โรงพยาบาลล่าช้า	1.32	.79	1.62	.95	-1.88

* $p < .05$

จากตารางที่ 9 จะเห็นว่า เมื่อพิจารณารายละเอียดของแหล่งความเครียดของญาติผู้ป่วยที่มีภูมิลำเนาต่างกัน ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีภูมิลำเนาอยู่ในชนบทมีค่าเฉลี่ยคะแนนความเครียดสูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเมือง ในเรื่องต่อไปนี้ "ขาดรายได้จากการประกอบอาชีพของผู้ป่วย" "ต้องเสียเงินค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูผู้ป่วยที่บ้าน" "ต้องเสียเงินค่าใช้จ่ายสูงในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ป่วย" "ต้องเสียค่าเดินทางแพงในการพาผู้ป่วยมาพบแพทย์หรือมารับยา" "ญาติอื่น ๆ แสดงท่าทีรังเกียจไม่ยอมรับ" "สมาชิกบางคนในครอบครัวมีสีหน้า ท่าทาง คำพูด ที่ไม่ดีต่อผู้ป่วย" "ผู้ป่วยไม่ให้ความสำคัญที่ญาติได้ดูแลเอาใจใส่เขา" "คิดว่าการมีญาติป่วยเป็นโรคจิต ทำให้ผู้อื่นมองว่าตระกูลมีความผิดปกติ" "คิดว่าที่ผ่านมามีบางครั้งที่ท่านใช้อารมณ์กับผู้ป่วยมากเกินไป" "หวังใยอนาคตของตนเองในฐานะเป็นญาติที่ใกล้ชิดของผู้ป่วยโรคจิต" "ผู้ป่วยทำร้ายร่างกายผู้อื่น" "ผู้ป่วยแสดงออกว่ามีความคิดหลงผิดต่าง ๆ" "เวลาผู้ป่วยมีอาการเกิดขึ้นอย่างฉุกเฉิน ต้องเดินทางไกลเพื่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน" "ไม่รู้จักหน่วยงานทางสุขภาพจิตที่อยู่ใกล้บ้านว่ามีที่ใดบ้าง" และ "บริการนอกเวลาไม่สะดวก"

ตอนที่ 5 เปรียบเทียบรายละเอียดของแหล่งความเครียดของญาติผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีระดับการศึกษาต่างกัน

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบรายละเอียดของแหล่งความเครียดของญาติผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีการศึกษาระดับไม่ได้เรียนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 และมีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปริญญาตรีขึ้นไป

แหล่งความเครียด	ไม่ได้เรียนถึง ประถมศึกษา ปีที่ 6		มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปริญญาตรี ขึ้นไป		t
	\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.	
ก. <u>ด้านเศรษฐกิจ</u>					
1. ขาดรายได้จากการประกอบอาชีพของผู้ป่วย	2.05	1.09	1.68	1.18	1.68
2. ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูผู้ป่วยที่บ้าน	2.16	1.16	1.51	.87	3.01*
3. ต้องเสียเงินค่าใช้จ่ายสูงในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาที่ป่วย	1.90	1.08	1.49	.96	2.02*
4. ต้องเสียค่าเดินทางแพงในการพาผู้ป่วยมาพบแพทย์หรือมารับยา	1.95	1.14	1.59	.96	1.67
5. ผู้ป่วยใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย	1.61	1.06	1.86	1.06	-1.20
ข. <u>ด้านชีวิตสังคมและส่วนตัว</u>					
6. ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะไปร่วมกิจกรรมทางสังคมได้ตั้งแต่ก่อน เนื่องจากต้องดูแลผู้ป่วย	2.31	1.10	2.00	1.08	1.45
7. เพื่อนแสดงที่ท้าวรังเกียจ ไม่ยอมรับท่าน	1.47	.93	1.30	.62	1.20
8. ญาติอื่น ๆ แสดงที่ท้าวรังเกียจ ไม่ยอมรับท่าน	1.53	.97	1.46	.90	.38

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบรายละเอียดของแหล่งความเครียดของญาติผู้ป่วยโรคจิตเภท ที่มีการศึกษาระดับไม่ได้เรียนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปริญญาตรีขึ้นไป (ต่อ)



แหล่งความเครียด	ไม่ได้เรียนถึง ประถมศึกษา ปีที่ 6		มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปริญญาตรี ขึ้นไป		t
	\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.	
9. ไม่กล้าเผชิญหน้ากับเพื่อนหรือบุคคลอื่น เนื่องจากความอับอาย	1.57	.98	1.14	.48	3.23*
10. ไม่กล้าเชิญผู้อื่นมาที่บ้านเนื่องจากความ อับอายที่มีผู้ป่วยอยู่ที่บ้าน	1.55	1.02	1.27	.73	1.73
11. ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะทำกิจกรรมส่วนตัว ได้ตามที่ต้องการ เนื่องจากต้องดูแลผู้ป่วย	2.18	1.15	1.78	1.11	1.77
12. ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะทำงานอดิเรก ได้ตามที่ต้องการ เนื่องจากต้องดูแลผู้ป่วย	1.98	1.15	1.54	.99	2.00*
ค. <u>ความสัมพันธ์สภาพภายในครอบครัว</u>					
13. สมาชิกบางคนในครอบครัวมีสีหน้า ท่าทาง คำพูด ที่ไม่ดีต่อผู้ป่วย	2.04	1.25	2.27	1.15	-.97
14. ผู้ป่วยไม่พูดคุยเมื่อทานสนทนาด้วย	1.70	1.05	1.73	.96	-.15
15. ผู้ป่วยไม่ให้ความสำคัญที่ท่านได้ดูแลเอา ใจใส่เขา	1.87	1.07	1.84	1.09	.14
16. ผู้ป่วยหลบหน้าไม่ยอมอยู่ใกล้ท่าน	1.48	.92	1.46	.77	.13
17. ผู้ป่วยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำหรือคำ บอกกล่าวของท่าน	2.23	1.19	2.27	1.17	-.18
18. ผู้ป่วยมักโต้เถียงท่านอยู่เสมอ	1.88	1.15	1.95	1.20	-.29

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบรายละเอียดของแหล่งความเครียดของผู้ป่วยโรคจิตเภท ที่มี การศึกษาระดับมัธยมศึกษาไม่ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 และมีชั้นเรียนปีที่ 1 ถึง ปริญญาตรีขึ้นไป (ต่อ)

แหล่งความเครียด	ไม่ได้เรียนถึง ประถมศึกษา ปีที่ 6		มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปริญญาตรี ขึ้นไป		t
	\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.	
19. ผู้ป่วยมีสีหน้า ท่าทาง หรือคำพูด ที่ไม่เป็นมิตร	2.07	1.19	2.00	1.20	.31
20. สมาชิกในครอบครัว ต่างให้ความ เอาใจใส่ผู้ป่วยจนไม่สนใจท่าน	1.00	-	1.00	-	-
21. ผู้ป่วยและสมาชิกในครอบครัวมีการ ทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่เสมอ	1.84	1.19	1.78	1.08	.26
ง. ความอับอาย					
22. คิดว่าการมีญาติป่วยด้วยโรคจิตเป็นเรื่อง น่าอับอาย	1.58	1.00	1.41	.80	.93
23. คิดว่าการมีญาติป่วยเป็นโรคจิต ทำให้ เสียชื่อเสียงเกียรติยศ	1.57	.99	1.46	.84	.57
24. คิดว่าการมีญาติป่วยเป็นโรคจิต ทำให้ ผู้อื่นมองว่าตระกูลมีความผิดปกติ	1.89	1.15	1.68	.92	1.01
25. น้าอับอายที่ผู้ป่วยแสดงพฤติกรรมแปลก ๆ ต่อหน้าผู้อื่นขณะที่ท่านอยู่ด้วย	2.17	1.15	2.11	1.15	.27
26. น้าอับอายที่คนอื่นเห็นร่างกายผู้ป่วย สกปรกและมีกลิ่นเหม็นขณะที่ท่านอยู่ด้วย	1.15	.98	1.62	.98	.41
27. น้าอับอายที่จะพาผู้ป่วยไปรับการรักษาที่ โรงพยาบาลโรคจิต	1.34	.79	1.24	.64	.64

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบรายละเอียดของแหล่งความเครียดของญาติของผู้ป่วยโรคจิตเภท ที่มี การศึกษาระดับไม่ได้เรียนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ปริญญาตรีขึ้นไป (ต่อ)

แหล่งความเครียด	ไม่ได้เรียนถึง ประถมศึกษา ปีที่ 6		มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปริญญาตรี ขึ้นไป		t
	\bar{x}	S.D.	\bar{x}	S.D.	
จ. ความรู้สึกผิด					
28. คิดว่าการเลี้ยงดูหรือการปฏิบัติของท่าน ต่อผู้ป่วยมีส่วนทำให้ผู้ป่วยป่วยเป็น โรคจิต	1.23	.67	1.57	.90	-2.05*
29. คิดว่าผู้ป่วยคงไม่ป่วยเป็นโรคจิต ถ้าท่าน ได้รับหาไปรักษาตั้งแต่เริ่มมีอาการผิดปกติ	1.55	1.02	2.05	1.33	-2.03*
30. คิดว่าที่ผ่านมาท่านไม่ได้ให้ความช่วยเหลือ ระดับประคองผู้ป่วยอย่างเต็มที่	1.55	.95	1.70	1.08	-.76
31. คิดว่าที่ผ่านมาบางครั้งท่านใช้อารมณ์ กับผู้ป่วยมากเกินไป	1.77	1.04	2.32	1.08	-2.66*
ฉ. ความกังวล					
32. กังวลว่าในอนาคตผู้ป่วยจะดำเนินชีวิต ต่อไปอย่างไร	2.88	1.17	2.97	1.17	-.40
33. ห่วงใยอนาคตของตนเองในฐานะเป็นญาติ ที่ใกล้ชิดของผู้ป่วยโรคจิต	1.76	1.07	2.05	1.29	-1.31
34. ห่วงใยอนาคตของคนอื่น ๆ ในครอบครัว ในฐานะเป็นญาติที่ใกล้ชิดของผู้ป่วยโรคจิต	1.77	1.11	2.05	1.15	-1.28

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบรายละเอียดของแหล่งความเครียดของญาติผู้ป่วยโรคจิตเภท ที่มี
การศึกษาระดับไม่ได้เรียนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง
ปริญญาตรีขึ้นไป (ต่อ)

แหล่งความเครียด	ไม่ได้เรียนถึง ประถมศึกษา ปีที่ 6		มัธยมศึกษาปีที่ ถึงปริญญาตรี ขึ้นไป		t
	\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.	
35. ไม่ทราบว่าใครจะดูแลผู้ป่วย ถ้าท่าน ต้องเสียชีวิตไป	2.93	1.17	2.57	1.21	1.54
36. ไม่สามารถรักษาผู้ป่วยให้หายคือคงเดิม	3.05	.99	2.89	1.20	.75
ข. พฤติกรรมทางเพศของผู้ป่วย					
37. ผู้ป่วยมีความต้องการทางเพศมากขึ้น	1.14	.59	1.24	.76	-.77
38. ผู้ป่วยมีความต้องการทางเพศน้อยลง	1.00	.00	1.03	.16	-
39. ผู้ป่วยแสดงความสนใจเพศตรงข้าม ออกมาอย่างไม่เหมาะสม	1.28	.77	1.43	.93	-.96
40. ท่านกลัวว่าผู้ป่วยจะถูกหลอกหลวงเรื่อง เพศ	1.81	1.22	1.65	1.16	.67
41. ท่านกลัวว่าผู้ป่วยจะตั้งครรภ์นอกสมรส	1.55	1.10	1.49	1.07	.31
ข. พฤติกรรมที่เป็นปัญหา					
42. ผู้ป่วยไม่ค่อยพูด	1.72	1.07	2.05	1.18	-1.51
43. ผู้ป่วยมักอยู่คนเดียว	1.54	.98	2.03	1.26	-2.29*
44. ผู้ป่วยไม่ช่วยทำงานบ้าน	1.54	.93	1.59	1.01	-.28
45. ผู้ป่วยทำงานชามาก	1.27	.68	1.46	.90	-1.17

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบรายละเอียดของแหล่งความเครียดของญาติผู้ป่วยโรคจิตเภท ที่มี
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง
ปริญญาตรีขึ้นไป (ต่อ)

แหล่งความเครียด	ไม่ได้เรียนถึง ประถมศึกษา ปีที่ 6		มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปริญญาตรี ขึ้นไป		t
	\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.	
46. ผู้ป่วยไม่สามารถทำกิจกรรมประจำวัน ด้วยตนเองได้ ต้องคอยช่วยเหลือ	1.24	.64	1.16	.50	.67
47. ผู้ป่วยมีปัญหาเรื่องการรับประทานยา	2.05	1.24	1.86	1.25	.75
48. ผู้ป่วยกลางคืนไม่นอน มีพฤติกรรมรบกวน คนอื่น ๆ	2.59	1.27	2.51	1.33	.30
49. ผู้ป่วยหนีออกจากบ้าน เร่รอนไปตาม สถานที่ต่าง ๆ	1.69	1.20	1.76	1.21	-.29
50. ผู้ป่วยทำร้ายร่างกายผู้อื่น	1.61	1.11	1.76	1.26	-.62
51. ผู้ป่วยทำลายสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ	1.99	1.24	1.51	1.10	2.01*
52. ผู้ป่วยแสดงออกว่ามีความคิดหลงผิดต่าง ๆ	1.98	1.25	2.05	1.20	-.32
53. ผู้ป่วยแสดงออกว่าได้ยินเสียงคนมาพูด โดยไม่มีคนพูดด้วย	1.83	1.14	2.14	1.23	-1.32
54. ผู้ป่วยพยายามฆ่าตัวตาย	1.45	1.03	1.11	.46	2.49*
ณ. การติดต่อกับสื่อสารกับเจ้าหน้าที่					
55. เจ้าหน้าที่ที่ไปติดต่อกับผู้มีอำนาจและหาทาง ไม่เป็นมิตร	1.12	.45	1.32	.71	-1.61
56. เจ้าหน้าที่ไม่เปิดโอกาสให้ท่านซักถาม ข้อข้องใจ	1.12	.50	1.32	.75	-1.51

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบรายละเอียดของแหล่งความเครียดของญาติผู้ป่วยโรคจิตเภท ที่มี
การศึกษาระดับไม่ได้เรียนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง
ปริญญาตรีขึ้นไป (ต่อ)

แหล่งความเครียด	ไม่ได้เรียนถึง ประถมศึกษา ปีที่ 6		มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปริญญาตรี ขึ้นไป		t
	\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.	
57. เจ้าหน้าที่ตอบคำถามไม่กระจ่างชัด	1.13	.44	1.27	.69	-1.11
58. การซักถามซ้ำ ๆ เกี่ยวกับประวัติ ความเจ็บป่วยของผู้ป่วยจากเจ้าหน้าที่ หลายคน	1.02	.15	1.16	.55	-1.49
59. เจ้าหน้าที่พูดเป็นเชิงตำหนิว่าท่านหรือ ญาติ ๆ เป็นผู้ทำให้ผู้ป่วยเป็นโรคจิต	1.05	.27	1.05	.33	-.10
60. เจ้าหน้าที่พูดเป็นเชิงตำหนิว่าท่านหรือ ญาติ ๆ เป็นผู้ทำให้ผู้ป่วยเกิดการป่วยซ้ำ	1.17	.64	1.05	.23	1.44
61. แพทย์และ/หรือพยาบาลไม่รับฟังข้อสังเกต ของท่านเกี่ยวกับอาการของผู้ป่วย	1.12	.55	1.08	.28	.52
จ. ระบบบริการทางสุขภาพจิต					
62. หน่วยงานของรัฐไม่คอยช่วยเหลือผู้ป่วย เท่าที่ควร	1.42	.93	1.51	.93	-.50
63. หน่วยงานของรัฐไม่ได้อาศัยให้ผู้ป่วย	1.25	.66	1.27	.69	-.13
64. หน่วยงานไม่มีการให้ความรู้แก่ญาติเกี่ยวกับ การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน	1.18	.52	1.46	.80	-1.94
65. เวลาผู้ป่วยมีอาการเกิดขึ้นอย่างฉุกเฉิน ต้องเค้นทางไกลเพื่อขอความช่วยเหลือ จากหน่วยงาน	1.90	1.23	1.92	1.21	-.06

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบรายละเอียดของแหล่งความเครียดของญาติผู้ป่วยโรคจิตเภท ที่มี การศึกษาระดับไม่ได้เรียนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 และมีชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ปริญญาตรีขึ้นไป (ต่อ)

แหล่งความเครียด	ไม่ได้เรียนถึง ประถมศึกษา ปีที่ 6		มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปริญญาตรี ขึ้นไป		t
	\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.	
66. ไม่รู้จักหน่วยงานทางสุขภาพจิตที่อยู่ใกล้ บ้าน ว่ามีที่ใดบ้าง	1.35	.85	1.68	1.03	-1.82
67. บริการนอกเวลาราชการไม่สะดวก	1.37	.87	1.76	1.14	-.82
68. บริการในวันหยุดราชการไม่สะดวก	1.24	.67	1.92	1.16	-3.31*
69. ไม่ทราบขั้นตอนของการขอรับบริการ	1.59	.87	1.62	1.01	-.44
70. ทางโรงพยาบาลดูแลไม่ทั่วถึง ปล่อยให้ ผู้ป่วยหลบหนีออกจากโรงพยาบาลก่อนที่จะ มีอาการทุเลาพอที่จะอยู่ที่บ้านได้	1.18	.68	1.46	.99	-1.79
71. ทางโรงพยาบาลจำหน่ายผู้ป่วยออกจาก โรงพยาบาลเร็วเกินไป ขณะที่อาการ ผู้ป่วยยังไม่ทุเลา	1.48	.93	1.38	.86	.58
72. การให้บริการที่โรงพยาบาลล่าช้า	1.34	.74	1.76	1.10	-2.13*

* $P < .05$

จากตารางที่ 10 แสดงให้เห็นว่า ญาติผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความเครียดเนื่องจากสถานการณ์ต่าง ๆ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 12 ข้อ โดยที่ญาติผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีการศึกษาระดับไม่ได้เรียนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยของความเครียดสูงกว่าญาติที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปริญญาตรีขึ้นไป ในเรื่อง

"ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูผู้ป่วยที่บ้าน" "ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย
 อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ป่วย" "ไม่กล้าเผชิญหน้ากับเพื่อนหรือบุคคลอื่น เนื่องจากความ
 อับอาย" "ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะทำงานอดิเรกได้ตามที่ต้องการ เนื่องจากต้องดูแลผู้ป่วย"
 "ผู้ป่วยทำลายสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ " และ "ผู้ป่วยพยายามฆ่าตัวตาย" ส่วนญาติผู้ป่วยโรค
 จิตเภทที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปริญญาตรีขึ้นไป มีคะแนนเฉลี่ยของความเครียดสูง
 กว่าญาติที่มีการศึกษาระดับไม่ได้เรียนถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ในเรื่อง "คิดว่าการเล่นกีฬาหรือการ
 ปฏิบัติของญาติต่อผู้ป่วยมีส่วนทำให้ผู้ป่วยป่วยเป็นโรคจิต" "คิดว่าผู้ป่วยคงไม่ป่วยเป็นโรคจิต ถ้า
 ญาติได้รับพาไปรักษาตั้งแต่เริ่มมีอาการผิดปกติ" "คิดว่าที่ผ่านมามางครั้งญาติใช้อารมณ์กับผู้ป่วย
 มากเกินไป" "ผู้ป่วยมักอยู่คนเดียว" "บริการในวันหยุดราชการไม่สะดวก" และ "การให้บริการ
 ที่โรงพยาบาลลาซา"



ศูนย์วิทยพัชกร
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตอนที่ 6 เปรียบเทียบรายละเอียดของแหล่งความเครียดของญาติผู้ป่วยโรคจิตเภทชายและหญิง

ตารางที่ 11 เปรียบเทียบรายละเอียดของแหล่งความเครียดของญาติผู้ป่วยโรคจิตเภทชายและญาติผู้ป่วยโรคจิตเภทหญิง

แหล่งความเครียด	ญาติของผู้ป่วย โรคจิตเภทชาย N = 66		ญาติของผู้ป่วย โรคจิตเภทหญิง N = 54		t
	\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.	
ก. ด้านเศรษฐกิจ					
1. ขาดรายได้จากประกอบอาชีพของผู้ป่วย	1.94	1.15	1.93	1.11	.06
2. ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูผู้ป่วย ที่บ้าน	1.88	1.06	2.06	1.19	-.86
3. ต้องเสียเงินค่าใช้จ่ายสูงในการรักษา พยาบาลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา ที่ป่วย	1.74	1.03	1.81	1.10	-.37
4. ต้องเสียค่าเดินทางแพงในการพาผู้ป่วย มาพบแพทย์หรือมารับยา	1.71	1.02	2.00	1.17	-1.44
5. ผู้ป่วยใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย	1.83	1.12	1.52	.97	1.63
ข. ด้านชีวิตสังคมและส่วนตัว					
6. ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะไปร่วมกิจกรรม ทางสังคมได้ตั้งแต่ก่อนเนื่องจากต้อง ดูแลผู้ป่วย	2.24	1.10	2.19	1.12	.28
7. เพื่อนแสดงท่าทีรังเกียจ ไม่ยอมรับท่าน	1.35	.75	1.50	.95	-.98
8. ญาติอื่น ๆ แสดงท่าทีรังเกียจ ไม่ยอมรับ ท่าน	1.48	.92	1.54	.99	-.30

ตารางที่ 11 เปรียบเทียบรายละเอียดของแหล่งความเครียดของญาติผู้ป่วยโรคจิตเภทชายและญาติผู้ป่วยโรคจิตเภทหญิง (ต่อ)

แหล่งความเครียด	ญาติของผู้ป่วยโรคจิตเภทชาย N = 66		ญาติของผู้ป่วยโรคจิตเภทหญิง N = 54		t
	\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.	
9. ไม่กล้าเผชิญหน้ากับเพื่อนหรือบุคคลอื่น เนื่องจากความอับอาย	1.38	.87	1.50	.89	-.75
10. ไม่กล้าเชิญผู้อื่นมาที่บ้านเนื่องจากความ อับอายที่มีผู้ป่วยอยู่ที่บ้าน	1.47	.96	1.46	.93	.04
11. ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะทำกิจกรรมส่วนตัว ได้ตามที่ต้องการ เนื่องจากต้องดูแล ผู้ป่วย	2.05	1.14	2.07	1.16	-.14
12. ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะทำงานอดิเรก ได้ตามที่ต้องการ เนื่องจากต้องดูแล ผู้ป่วย	1.82	1.09	1.87	1.15	-.25
ค. <u>ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว</u>					
13. สมาชิกบางคนในครอบครัวมีสีหน้า ท่าทาง คำพูด ที่ไม่ดีต่อผู้ป่วย	2.14	1.21	2.07	1.24	.28
14. ผู้ป่วยไม่พูดคุยเมื่อท่านสนทนาควย	1.73	1.06	1.69	.97	.22
15. ผู้ป่วยไม่ให้ความสำคัญที่ท่านได้ดูแล เอาใจใส่เขา	1.92	1.10	1.78	1.04	.74
16. ผู้ป่วยหลบหน้าไม่ยอมอยู่ใกล้ท่าน	1.55	.90	1.39	.83	.98
17. ผู้ป่วยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำหรือคำ บอกกล่าวของท่าน	2.23	1.20	2.26	1.17	-.15

ตารางที่ 11 เปรียบเทียบรายละเอียดของแหล่งความเครียดของญาติผู้ป่วยโรคจิตเภทชายและญาติผู้ป่วยโรคจิตเภทหญิง (ต่อ)

แหล่งความเครียด	ญาติของผู้ป่วยโรคจิตเภทชาย N = 66		ญาติของผู้ป่วยโรคจิตเภทหญิง N = 54		t
	\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.	
18. ผู้ป่วยมักโต้เถียงท่านอยู่เสมอ	1.97	1.20	1.81	1.12	.72
19. ผู้ป่วยมีสีหน้า ท่าทาง หรือคำพูดที่ไม่เป็นมิตร	2.23	1.24	1.83	1.10	1.83
20. สมาชิกในครอบครัวต่างให้ความเอาใจใส่ผู้ป่วย จนไม่ใส่ใจท่าน	1.00	0.00	1.00	0.00	-
21. ผู้ป่วยและสมาชิกในครอบครัวมีการทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่เสมอ	1.58	.993	2.13	1.28	* -2.68
ง. ความอับอาย					
22. คิดว่าการมีญาติป่วยด้วยโรคจิตเป็นเรื่องน่าอับอาย	1.56	.96	1.48	.93	.46
23. คิดว่าการมีญาติป่วยเป็นโรคจิต ทำให้เสียชื่อเสียงเกียรติยศ	1.53	.93	1.54	.97	-.04
24. คิดว่าการมีญาติป่วยเป็นโรคจิต ทำให้ผู้อื่นมองว่าตระกูลมีความผิดปกติ	1.80	1.07	1.85	1.11	-.24
25. น้าอับอายที่ผู้ป่วยแสดงพฤติกรรมแปลก ๆ ต่อหน้าผู้อื่นขณะที่ท่านอยู่ด้วย	2.11	1.11	2.20	1.18	-.46
26. น้าอับอายที่คนอื่นเห็นร่างกายผู้ป่วยสกปรกและมีกลิ่นเหม็นขณะที่ท่านอยู่ด้วย	1.70	1.07	1.41	.84	1.63
27. น้าอับอายที่จะพาผู้ป่วยไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลโรคจิต	1.26	.69	1.37	.81	-.83

ตารางที่ 11 เปรียบเทียบรายละเอียดของแหล่งความเครียดของญาติผู้ป่วยโรคจิตเภทชายและญาติผู้ป่วยโรคจิตเภทหญิง (ต่อ)

แหล่งความเครียด	ญาติของผู้ป่วย โรคจิตเภทชาย N = 66		ญาติของผู้ป่วย โรคจิตเภทหญิง N = 54		t
	\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.	
จ. ความรู้สึกผิด					
28. คิดว่าการเลี้ยงดูหรือการปฏิบัติของท่าน ต่อผู้ป่วยมีส่วนทำให้ผู้ป่วยป่วยเป็น โรคจิต	1.50	.92	1.13	.44	2.91 *
29. คิดว่าผู้ป่วยคงไม่ป่วยเป็นโรคจิต ถ้า ท่านได้รักษาไปรักษาตั้งแต่เริ่มมีอาการ	1.80	1.22	1.59	1.04	1.01
30. คิดว่าที่ผ่านมาท่านไม่ได้ให้ความ ช่วยเหลือประคับประคองผู้ป่วยอย่าง เต็มที่	1.67	1.06	1.52	.91	.81
31. คิดว่าที่ผ่านมาบางครั้งท่านใช้อารมณ์ กับผู้ป่วยมากเกินไป	1.97	1.10	1.91	1.07	.31
ฉ. ความกังวล					
32. กังวลว่าในอนาคตผู้ป่วยจะดำเนินชีวิต ต่อไปอย่างไร	2.92	1.19	2.89	1.14	.16
33. ห่วงใยอนาคตของตนเองในฐานะเป็น ญาติที่ใกล้ชิดของผู้ป่วยโรคจิต	1.97	1.16	1.70	1.11	1.27
34. ห่วงใยอนาคตของคนอื่น ๆ ในครอบครัว ในฐานะเป็นญาติที่ใกล้ชิดของผู้ป่วย โรคจิต	1.83	1.10	1.89	1.16	-.27

ตารางที่ 11 เปรียบเทียบรายละเอียดของแหล่งความเครียดของญาติผู้ป่วยโรคจิตเภทชายและญาติผู้ป่วยโรคจิตเภทหญิง (ต่อ)

แหล่งความเครียด	ญาติของผู้ป่วยโรคจิตเภทชาย N = 66		ญาติของผู้ป่วยโรคจิตเภทหญิง N = 54		t
	\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.	
35. ไม่ทราบว่าใครจะดูแลผู้ป่วย ถ้าท่านต้องเสียชีวิตไป	2.77	1.25	2.87	1.12	-.45
36. ไม่สามารถรักษานักผู้ป่วยให้หายคือคงเดิม	3.02	.95	2.98	1.17	.17
ข. พฤติกรรมทางเพศของผู้ป่วย					
37. ผู้ป่วยมีความต้องการทางเพศมากขึ้น	1.24	.75	1.09	.49	1.32
38. ผู้ป่วยมีความต้องการทางเพศน้อยลง	1.02	.12	1.00	.00	-
39. ผู้ป่วยแสดงความสนใจเพศตรงข้ามออกมาอย่างไม่เหมาะสม	1.36	.87	1.28	.76	.57
40. ท่านกลัวว่าผู้ป่วยจะถูกหลอกกลางเรื่องเพศ	1.15	.56	2.50	1.36	-6.84*
41. ท่านกลัวว่าผู้ป่วยจะตั้งครรภ์นอกสมรส	1.00	.00	2.19	1.36	-
ข. พฤติกรรมที่เป็นปัญหา					
42. ผู้ป่วยไม่คอยพูด	1.88	1.09	1.76	1.15	.58
43. ผู้ป่วยมักอยู่คนเดียว	1.77	1.09	1.59	1.09	.90
44. ผู้ป่วยไม่ช่วยทำงานบ้าน	1.76	1.02	1.31	.80	2.60*
45. ผู้ป่วยทำงานชามาก	1.21	.62	1.46	.88	-1.76
46. ผู้ป่วยไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันด้วยตนเองได้ ต้องคอยช่วยเหลือ	1.14	.49	1.31	.70	-1.59

ตารางที่ 11 เปรียบเทียบรายละเอียดของแหล่งความเครียดของญาติผู้ป่วยโรคจิตเภทชายและญาติผู้ป่วยโรคจิตเภทหญิง (ต่อ)

แหล่งความเครียด	ญาติของผู้ป่วยโรคจิตเภทชาย N = 66		ญาติของผู้ป่วยโรคจิตเภทหญิง N = 54		t
	\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.	
47. ผู้ป่วยมีปัญหาเรื่องการรับประทานยา	1.92	1.15	2.07	1.34	- .66
48. ผู้ป่วยกลางคืนไม่นอน มีพฤติกรรมรบกวนคนอื่น ๆ	2.65	1.26	2.46	1.31	.80
49. ผู้ป่วยหนีออกจากบ้าน เรรอนไปตามสถานที่ต่าง ๆ	1.53	1.07	1.93	1.32	-1.82
50. ผู้ป่วยทำร้ายร่างกายผู้อื่น	1.89	1.29	1.37	.90	2.61*
51. ผู้ป่วยทำลายสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ	1.92	1.27	1.74	1.14	.83
52. ผู้ป่วยแสดงออกว่ามีความคิดหลงผิดต่าง ๆ	2.03	1.27	1.96	1.20	.30
53. ผู้ป่วยแสดงออกว่าได้ยินเสียงคนมาพูดโดยไม่มีคนพูดอยู่ด้วย	1.86	1.15	2.00	1.20	- .63
54. ผู้ป่วยพยายามฆ่าตัวตาย	1.35	.92	1.33	.89	.09
๗. การติดต่อกับสื่อสารกับเจ้าหน้าที่					
55. เจ้าหน้าที่ที่ไปติดต่อกับผู้มีสิทธิ์และหาทางไม่เป็นมิตร	1.20	.53	1.17	.58	.30
56. เจ้าหน้าที่ไม่เปิดโอกาสให้ท่านซักถามข้อข้องใจ	1.23	.63	1.13	.55	.90
57. เจ้าหน้าที่ตอบคำถามไม่กระจ่างชัด	1.15	.47	1.20	.60	- .54
58. การซักถามซ้ำ ๆ เกี่ยวกับประวัติความเจ็บป่วยของผู้ป่วยจากเจ้าหน้าที่หลายคน	1.09	.42	1.04	.19	.93

ตารางที่ 11 เปรียบเทียบรายละเอียดของแหล่งความเครียดของญาติผู้ป่วยโรคจิตเภทชายและญาติผู้ป่วยโรคจิตเภทหญิง (ต่อ)

แหล่งความเครียด	ญาติของผู้ป่วยโรคจิตเภทชาย N = 66		ญาติของผู้ป่วยโรคจิตเภทหญิง N = 54		t
	\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.	
59. เจ้าหน้าที่พูดเป็นเชิงตำหนิตานหรือญาติ ๆ เป็นผู้ทำให้ผู้ป่วยเป็นโรคจิต	1.03	.25	1.07	.33	-.81
60. เจ้าหน้าที่พูดเป็นเชิงตำหนิตานหรือญาติ ๆ เป็นผู้ทำให้ผู้ป่วยเกิดการป่วยซ้ำ	1.17	.60	1.09	.49	.73
61. แพทย์และ/หรือพยาบาลไม่รับฟังข้อสังเกตของท่านเกี่ยวกับอาการของผู้ป่วย	1.11	.47	1.11	.50	-.06
ญ. ระบบบริการทางสุขภาพจิต					
62. หน่วยงานของรัฐไม่ให้ความช่วยเหลือผู้ดูแลผู้ป่วยเท่าที่ควร	1.41	.88	1.50	.99	-.53
63. หน่วยงานของรัฐไม่ได้ฝึกอาชีพให้ผู้ป่วย	1.24	.66	1.28	.69	-.29
64. หน่วยงานไม่มีการให้ความรู้แก่ญาติเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน	1.23	.58	1.31	.70	-.75
65. เวลาผู้ป่วยมีอาการเกิดขึ้นอย่างฉุกเฉินต้องเดินทางไกลเพื่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน	2.02	1.23	1.78	1.19	1.06
66. ไม่รู้จักหน่วยงานทางสุขภาพจิตที่อยู่ใกล้บ้านว่ามีที่ใดบ้าง	1.58	.99	1.30	.79	1.68

ตารางที่ 11 เปรียบเทียบรายละเอียดของแหล่งความเครียดของญาติผู้ป่วยโรคจิตเภทชายและญาติผู้ป่วยโรคจิตเภทหญิง (ต่อ)

แหล่งความเครียด	ญาติของผู้ป่วยโรคจิตเภทชาย N = 66		ญาติของผู้ป่วยโรคจิตเภทหญิง N = 54		t
	\bar{X}	S.D.	\bar{X}	S.D.	
67. บริการนอกเวลาราชการไม่สะดวก	1.45	.86	1.54	1.09	-.46
68. บริการในวันหยุดราชการไม่สะดวก	1.48	.85	1.41	.91	.46
69. ไม่ทราบขั้นตอนของการขอรับบริการ	1.59	.89	1.54	.95	.32
70. ทางโรงพยาบาลดูแลผู้ป่วยไม่ทั่วถึง เป็นเหตุให้ผู้ป่วยหลบหนีออกจากโรงพยาบาลก่อนที่จะมีอาการทุเลาพอที่จะอยู่ที่บ้านได้	1.47	1.03	1.02	.14	3.53*
71. ทางโรงพยาบาลจำหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลเร็วเกินไป ขณะที่อาการผู้ป่วยยังไม่ทุเลา	1.59	1.02	1.28	.71	1.97
72. การให้บริการที่โรงพยาบาลล่าช้า	1.55	.88	1.37	.88	1.09

* $p < .05$

จากตารางที่ 11 ปรากฏว่า คะแนนเฉลี่ยความเครียดของญาติผู้ป่วยโรคจิตเภทชายและหญิง แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 6 ข้อ โดยญาติผู้ป่วยโรคจิตเภทชายมีคะแนนเฉลี่ยความเครียดสูงกว่าญาติผู้ป่วยโรคจิตเภทหญิง 4 ข้อ คือ "คิดว่าการเลี้ยงดูหรือการปฏิบัติของญาติคือผู้ป่วยมีส่วนทำให้ผู้ป่วยป่วยเป็นโรคจิต" "ผู้ป่วยไม่ช่วยทำงานบ้าน" "ผู้ป่วยทำร้ายร่างกายผู้อื่น" และ "ทางโรงพยาบาลดูแลผู้ป่วยไม่ทั่วถึง เป็นเหตุให้ผู้ป่วยหลบหนีออกจากโรงพยาบาลก่อนที่จะมีอาการทุเลาพอที่จะอยู่ที่บ้านได้"

ส่วนญาติผู้ป่วยโรคจิตเภทหญิง มีคะแนนเฉลี่ยความเครียดสูงกว่าญาติผู้ป่วยโรคจิตเภทชาย 2 ข้อ คือ "ญาติกลัวว่าผู้ป่วยจะถูกหลอกหลวงเรื่องเพศ" และ "ผู้ป่วยและสมาชิกในครอบครัวมีการทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่เสมอ"



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตอนที่ 7 วิเคราะห์ความแปรปรวนของรายละเอียดยของแหล่งความเครียดของญาติผู้ป่วยโรคจิตเภทที่ป่วยมาแล้วเป็นระยะเวลานานแตกต่างกัน

ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของรายละเอียดยของแหล่งความเครียดของญาติผู้ป่วยโรคจิตเภทที่ป่วยมาแล้วเป็นระยะเวลานาน 1 ถึง 5 ปี 5.1 ถึง 10 ปี และ 10 ปีขึ้นไป

แหล่งความเครียด	แหล่งความแปรปรวน	df	SS	MS	F
ก. <u>ด้านเศรษฐกิจ</u>					
1. ขาดรายได้จากการประกอบอาชีพของผู้ป่วย	ระหว่างกลุ่ม	2	10.54	5.27	4.37*
	ภายในกลุ่ม	117	140.93	1.20	
	รวม	119	151.47		
2. ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูผู้ป่วยที่บ้าน	ระหว่างกลุ่ม	2	7.57	3.79	3.14*
	ภายในกลุ่ม	117	141.22	1.20	
	รวม	119	148.79		
3. ต้องเสียเงินค่าใช้จ่ายสูงในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ป่วย	ระหว่างกลุ่ม	2	5.84	2.92	2.69
	ภายในกลุ่ม	117	127.09	1.09	
	รวม	119	132.93		
4. ต้องเสียค่าเดินทางแพงในการพาผู้ป่วยมาพบแพทย์หรือมารับยา	ระหว่างกลุ่ม	2	1.45	0.72	0.60
	ภายในกลุ่ม	117	140.54	1.20	
	รวม	119	141.99		
5. ผู้ป่วยใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย	ระหว่างกลุ่ม	2	2.55	1.27	1.14
	ภายในกลุ่ม	117	131.04	1.12	
	รวม	119	133.59		

ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของรายละเอียดของแหล่งความเครียดของญาติผู้ป่วยโรคจิตเภทที่ป่วยมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ถึง 5 ปี 5.1 ถึง 10 ปี และ 10 ปีขึ้นไป (ต่อ)

แหล่งความเครียด	แหล่งความแปรปรวน	df	SS	MS	F
ช. <u>ด้านชีวิตสังคมและส่วนตัว</u>					
6. ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะไปรวมกิจกรรมทางสังคมใดคั้งแต่ก่อนเนื่องจากต้องดูแลผู้ป่วย	ระหว่างกลุ่ม	2	6.42	3.21	2.72
	ภายในกลุ่ม	117	137.94	1.18	
	รวม	119	144.36		
7. เพื่อนแสดงที่ท้าวรังเกียจไม่ยอมรับท่าน	ระหว่างกลุ่ม	2	0.67	0.34	0.47
	ภายในกลุ่ม	117	84.49	0.72	
	รวม	119	85.17		
8. ญาติอื่น ๆ แสดงที่ท้าวรังเกียจไม่ยอมรับท่าน	ระหว่างกลุ่ม	2	0.16	0.08	0.09
	ภายในกลุ่ม	117	105.83	0.90	
	รวม	119	105.99		
9. ไม่กล้าเผชิญหน้ากับเพื่อนหรือบุคคลอื่นเนื่องจากความอับอาย	ระหว่างกลุ่ม	2	1.67	0.84	1.09
	ภายในกลุ่ม	117	89.79	0.77	
	รวม	119	91.47		
10. ไม่กล้าเชิญผู้อื่นมาที่บ้านเนื่องจากความอับอายที่มีผู้ป่วยอยู่ที่บ้าน	ระหว่างกลุ่ม	2	3.81	1.91	2.18
	ภายในกลุ่ม	117	102.06	0.87	
	รวม	119	105.87		
11. ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะทำกิจกรรมส่วนตัวใดตามที่ต้องการ เนื่องจากต้องดูแลผู้ป่วย	ระหว่างกลุ่ม	2	0.09	0.05	0.03
	ภายในกลุ่ม	117	156.50	1.34	
	รวม	119	156.59		

ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของรายละเอียดของแหล่งความเครียดของญาติผู้ป่วยโรคจิตเภทที่ป่วยมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ถึง 5 ปี 5.1 ถึง 10 ปี และ 10 ปีขึ้นไป (ต่อ)

แหล่งความเครียด	แหล่งความแปรปรวน	df	SS	MS	F
12. ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะทำงาน อดิเรกได้ตามที่ต้องการ เนื่องจาก ต้องดูแลผู้ป่วย	ระหว่างกลุ่ม	2	0.22	0.11	0.09
	ภายในกลุ่ม	117	147.77	1.26	
	รวม	119	147.99		
ค. <u>ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว</u>					
13. สมาชิกบางคนในครอบครัวมีสีหน้า ท่าทาง คำพูด ที่ไม่ดีต่อผู้ป่วย	ระหว่างกลุ่ม	2	1.35	0.67	0.45
	ภายในกลุ่ม	117	176.24	1.51	
	รวม	119	177.59		
14. ผู้ป่วยไม่พูดคุยเมื่อท่านสนทนาด้วย	ระหว่างกลุ่ม	2	1.43	0.71	0.69
	ภายในกลุ่ม	117	121.36	1.03	
	รวม	119	122.79		
15. ผู้ป่วยไม่ให้ความสำคัญที่ท่าน ได้ดูแลเอาใจใส่เขา	ระหว่างกลุ่ม	2	3.44	1.72	1.51
	ภายในกลุ่ม	117	133.15	1.14	
	รวม	119	136.59		
16. ผู้ป่วยหลบหน้าไม่ยอมอยู่ใกล้ท่าน	ระหว่างกลุ่ม	2	0.98	0.49	0.64
	ภายในกลุ่ม	117	88.95	0.76	
	รวม	119	89.93		

ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของรายละเอียดของแหล่งความเครียดของญาติผู้ป่วยโรคจิตเภทที่ป่วยมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ถึง 5 ปี 5.1 ถึง 10 ปี และ 10 ปีขึ้นไป (ต่อ)

แหล่งความเครียด	แหล่งความแปรปรวน	df	SS	MS	F
17. ผู้ป่วยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำหรือคำบอกกล่าวของท่าน	ระหว่างกลุ่ม	2	6.87	3.43	2.53
	ภายในกลุ่ม	117	159.12	1.36	
	รวม	119	165.99		
18. ผู้ป่วยมักโต้เถียงท่านอยู่เสมอ	ระหว่างกลุ่ม	2	1.47	0.73	0.54
	ภายในกลุ่ม	117	159.33	1.36	
	รวม	119	160.80		
19. ผู้ป่วยมีสีหน้า ท่าทาง หรือคำพูดที่ไม่เป็นมิตร	ระหว่างกลุ่ม	2	4.76	2.38	1.71
	ภายในกลุ่ม	117	162.94	1.39	
	รวม	119	167.70		
20. สมาชิกในครอบครัว ต่างให้ความเอาใจใส่ผู้ป่วยจนไม่สนใจท่าน	ระหว่างกลุ่ม	2	-	-	-
	ภายในกลุ่ม	117	-	-	
	รวม	119	-	-	
21. ผู้ป่วยและสมาชิกในครอบครัว มีการทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่เสมอ	ระหว่างกลุ่ม	2	4.21	2.11	1.59
	ภายในกลุ่ม	117	155.11	1.33	
	รวม	119	159.32		

ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของรายละเอียดของแหล่งความเครียดของญาติผู้ป่วยโรคจิตเภทที่ป่วยมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ถึง 5 ปี 5.1 ถึง 10 ปี และ 10 ปีขึ้นไป (ต่อ)

แหล่งความเครียด	แหล่งความแปรปรวน	df	SS	MS	F
จ. ความอับอาย					
22. คิดว่าการมีญาติป่วยด้วยโรคจิตเป็นเรื่องน่าอับอาย	ระหว่างกลุ่ม	2	1.02	0.51	0.57
	ภายในกลุ่ม	117	104.90	0.89	
	รวม	119	105.92		
23. คิดว่าการมีญาติป่วยเป็นโรคจิตทำให้เสียชื่อเสียงเกียรติยศ	ระหว่างกลุ่ม	2	5.33	2.67	3.10*
	ภายในกลุ่ม	117	100.54	0.86	
	รวม	119	105.87		
24. คิดว่าการมีญาติป่วยเป็นโรคจิตทำให้ผู้อื่นมองว่าตระกูลมีความผิดปกติ	ระหว่างกลุ่ม	2	4.07	2.04	1.76
	ภายในกลุ่ม	117	135.25	1.16	
	รวม	119	139.32		
25. นำอับอายที่ผู้ป่วยแสดงพฤติกรรมแปลก ๆ ต่อหน้าผู้อื่นขณะที่ทานอยู่ควย	ระหว่างกลุ่ม	2	1.75	0.88	0.67
	ภายในกลุ่ม	117	153.55	1.31	
	รวม	119	155.30		
26. นำอับอายที่คนอื่นเห็นร่างกายผู้ป่วยสกปรกและมีกลิ่นเหม็นขณะที่ทานอยู่ควย	ระหว่างกลุ่ม	2	0.67	0.33	0.34
	ภายในกลุ่ม	117	112.81	0.96	
	รวม	119	113.47		

ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของรายละเอียดของแหล่งความเครียดของญาติผู้ป่วยโรคจิตเภทที่ป่วยมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ถึง 5 ปี 5.1 ถึง 10 ปี และ 10 ปีขึ้นไป (ต่อ)

แหล่งความเครียด	แหล่งความแปรปรวน	df	SS	MS	F
27. นำอัมมอายุที่จะพาผู้ป่วยไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลโรคจิต	ระหว่างกลุ่ม	2	1.09	0.55	0.99
	ภายในกลุ่ม	117	64.50	0.55	
	รวม	119	65.59		
จ. <u>ความรู้สึกผิด</u>					
28. คิดว่าการเลี้ยงดูหรือการปฏิบัติของท่านต่อผู้ป่วยมีส่วนทำให้ผู้ป่วยป่วยเป็นโรคจิต	ระหว่างกลุ่ม	2	5.21	2.60	4.80*
	ภายในกลุ่ม	117	63.46	0.54	
	รวม	119	68.67		
29. คิดว่าผู้ป่วยคงไม่ป่วยเป็นโรคจิตถ้าท่านได้รับพาไปรักษาตั้งแต่เริ่มมีอาการผิดปกติ	ระหว่างกลุ่ม	2	8.43	4.21	3.37*
	ภายในกลุ่ม	117	146.36	1.25	
	รวม	119	154.79		
30. คิดว่าที่ผ่านมามาท่านไม่ได้ให้ความช่วยเหลือ ประคับประคองผู้ป่วยอย่างเต็มที่	ระหว่างกลุ่ม	2	2.19	1.10	1.12
	ภายในกลุ่ม	117	119.61	0.98	
	รวม	119	116.80		
31. คิดว่าที่ผ่านมามีบางครั้งท่านใช้อารมณ์กับผู้ป่วยมากเกินไป	ระหว่างกลุ่ม	2	1.53	0.76	0.65
	ภายในกลุ่ม	117	137.06	1.17	
	รวม	119	138.59		

ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของรายละเอียดของแหล่งความเครียดของญาติผู้ป่วยโรคจิตเภทที่ป่วยมาแล้วเป็นระยะเวลานาน 1 ถึง 5 ปี 5.1 ถึง 10 ปี และ 10 ปีขึ้นไป (ต่อ)

แหล่งความเครียด	แหล่งความแปรปรวน	df	SS	MS	F
ด. ความกังวล					
32. กังวลว่าในอนาคตผู้ป่วยจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไร	ระหว่างกลุ่ม	2	10.12	5.06	3.90*
	ภายในกลุ่ม	117	151.87	1.30	
	รวม	119	161.99		
33. ห่วงใยในอนาคตของตนเองในฐานะญาติที่ใกล้ชิดของผู้ป่วยโรคจิต	ระหว่างกลุ่ม	2	4.36	2.18	1.69
	ภายในกลุ่ม	117	150.94	1.29	
	รวม	119	155.30		
34. ห่วงใยในอนาคตของคนอื่น ๆ ในครอบครัว ในฐานะเป็นญาติที่ใกล้ชิดของผู้ป่วยโรคจิต	ระหว่างกลุ่ม	2	5.13	2.56	2.06
	ภายในกลุ่ม	117	145.47	1.24	
	รวม	119	150.50		
35. ไม่ทราบว่าใครจะดูแลผู้ป่วย ถ้าท่านต้องเสียชีวิตไป	ระหว่างกลุ่ม	2	3.76	1.88	1.34
	ภายในกลุ่ม	117	164.20	1.40	
	รวม	119	167.96		
36. ไม่สามารถรักษาผู้ป่วยให้หายดีดังเดิม	ระหว่างกลุ่ม	2	1.06	0.53	0.47
	ภายในกลุ่ม	117	130.94	1.12	
	รวม	119	132.00		

ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของรายละเอียดของแหล่งความเครียดของญาติผู้ป่วยโรคจิตเภทที่ป่วยมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ถึง 5 ปี 5.1 ถึง 10 ปี และ 10 ปีขึ้นไป (ต่อ)

แหล่งความเครียด	แหล่งความแปรปรวน	df	SS	MS	F
ช. พฤติกรรมทางเพศของผู้ป่วย					
37. ผู้ป่วยมีความต้องการทางเพศมากขึ้น	ระหว่างกลุ่ม	2	0.80	0.40	0.97
	ภายในกลุ่ม	117	48.52	0.41	
	รวม	119	49.33		
38. ผู้ป่วยมีความต้องการทางเพศน้อยลง	ระหว่างกลุ่ม	2	0.02	0.01	1.04
	ภายในกลุ่ม	117	0.97	0.01	
	รวม	119	0.99		
39. ผู้ป่วยแสดงความสนใจในเพศตรงข้ามออกมาอย่างไม่เหมาะสม	ระหว่างกลุ่ม	2	0.57	0.28	0.42
	ภายในกลุ่ม	117	79.76	0.68	
	รวม	119	80.33		
40. ท่านกลัวว่าผู้ป่วยจะถูกหลอกลวงเรื่องเพศ	ระหว่างกลุ่ม	2	10.26	5.13	3.71*
	ภายในกลุ่ม	117	161.73	1.38	
	รวม	119	171.99		
41. ท่านกลัวว่าผู้ป่วยจะตั้งครรภ์นอกสมรส	ระหว่างกลุ่ม	2	6.42	3.21	2.81
	ภายในกลุ่ม	117	133.45	1.14	
	รวม	119	139.87		

ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของรายละเอียดของแหล่งความเครียดของญาติผู้ป่วยโรคจิตเภทที่ป่วยมาแล้วเป็นระยะเวลานาน 1 ถึง 5 ปี 5.1 ถึง 10 ปี และ 10 ปีขึ้นไป (ต่อ)

แหล่งความเครียด	แหล่งความแปรปรวน	df	SS	MS	F
ซ. พฤติกรรมที่เป็นปัญหา					
42. ผู้ป่วยไม่คอยพูด	ระหว่างกลุ่ม	2	5.65	2.83	2.33
	ภายในกลุ่ม	117	141.67	1.21	
	รวม	119	147.32		
43. ผู้ป่วยมักอยู่คนเดียว	ระหว่างกลุ่ม	2	5.89	2.95	2.54
	ภายในกลุ่ม	117	135.70	1.16	
	รวม	119	141.59		
44. ผู้ป่วยไม่ช่วยทำงานบ้าน	ระหว่างกลุ่ม	2	3.08	1.54	1.73
	ภายในกลุ่ม	117	104.51	0.89	
	รวม	119	107.59		
45. ผู้ป่วยทำงานช้ามาก	ระหว่างกลุ่ม	2	2.25	1.13	2.00
	ภายในกลุ่ม	117	66.07	0.56	
	รวม	119	68.32		
46. ผู้ป่วยไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันด้วยตนเองได้ ต้องคอยช่วยเหลือ	ระหว่างกลุ่ม	2	0.13	0.06	0.18
	ภายในกลุ่ม	117	42.24	0.36	
	รวม	119	42.37		

ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของรายละเอียดของแหล่งความเครียดของญาติผู้ป่วยโรคจิตเภทที่ป่วยมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ถึง 5 ปี 5.1 ถึง 10 ปี และ 10 ปีขึ้นไป (ต่อ)

แหล่งความเครียด	แหล่งความแปรปรวน	df	SS	MS	F
47. ผู้ป่วยมีปัญหาเรื่องการรับประทานยา	ระหว่างกลุ่ม	2	1.86	0.93	0.60
	ภายในกลุ่ม	117	181.14	1.55	
	รวม	119	182.99		
48. ผู้ป่วยกลางคืนไม่นอน มีพฤติกรรมรบกวนคนอื่น ๆ	ระหว่างกลุ่ม	2	7.55	3.78	2.35
	ภายในกลุ่ม	117	187.91	1.61	
	รวม	119	195.47		
49. ผู้ป่วยหนีออกจากบ้าน เหวอนไปตามสถานที่ต่าง ๆ	ระหว่างกลุ่ม	2	1.15	0.58	0.40
	ภายในกลุ่ม	117	169.64	1.45	
	รวม	119	170.79		
50. ผู้ป่วยทำร้ายร่างกายผู้อื่น	ระหว่างกลุ่ม	2	0.42	0.21	0.15
	ภายในกลุ่ม	117	158.57	1.36	
	รวม	119	158.99		
51. ผู้ป่วยทำลายสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ	ระหว่างกลุ่ม	2	7.63	3.82	2.68
	ภายในกลุ่ม	117	166.36	1.42	
	รวม	119	173.99		
52. ผู้ป่วยแสดงออกว่ามีความคิดหลงผิดต่าง ๆ	ระหว่างกลุ่ม	2	0.66	0.33	0.21
	ภายในกลุ่ม	117	179.34	1.53	
	รวม	119	180.00		

ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของรายละเอียดของแหล่งความเครียดของญาติผู้ป่วยโรคจิตเภทที่ป่วยมาแล้วเป็นระยะเวลานาน 1 ถึง 5 ปี 5.1 ถึง 10 ปี และ 10 ปีขึ้นไป (ต่อ)

แหล่งความเครียด	แหล่งความแปรปรวน	df	SS	MS	F
53. ผู้ป่วยแสดงออกว่าไต่ยืนเสียงคนมาพูด โดยไม่มีคนพูดคุย	ระหว่างกลุ่ม	2	6.40	3.20	2.40
	ภายในกลุ่ม	117	155.92	1.33	
	รวม	119	162.32		
54. ผู้ป่วยพยายามฆ่าตัวตาย	ระหว่างกลุ่ม	2	0.25	0.12	0.15
	ภายในกลุ่ม	117	96.74	0.83	
	รวม	119	96.99		
<p>๗. การติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่</p>					
55. เจ้าหน้าที่ที่ไปติดต่อควมมีสีหน้าและท่าทางไม่เป็นมิตร	ระหว่างกลุ่ม	2	0.04	0.02	0.07
	ภายในกลุ่ม	117	35.92	0.31	
	รวม	119	35.96		
56. เจ้าหน้าที่ไม่เปิดโอกาสให้ท่านซักถามข้อข้องใจ	ระหว่างกลุ่ม	2	1.04	0.52	1.48
	ภายในกลุ่ม	117	40.93	0.35	
	รวม	119	41.97		
57. เจ้าหน้าที่ตอบคำถามไม่กระจ่างชัด	ระหว่างกลุ่ม	2	2.04	1.02	3.81*
	ภายในกลุ่ม	117	31.29	0.27	
	รวม	119	33.33		

ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของรายละเอียดของความเครียดของญาติผู้ป่วยโรคจิตเภทที่ป่วยมาแล้วเป็นระยะเวลานาน 1 ถึง 5 ปี 5.1 ถึง 10 ปี และ 10 ปีขึ้นไป (ต่อ)

แหล่งความเครียด	แหล่งความแปรปรวน	df	SS	MS	F
58. การซักถามซ้ำ ๆ เกี่ยวกับประวัติความเจ็บป่วยของผู้ป่วยจากเจ้าหน้าที่หลายคน	ระหว่างกลุ่ม	2	0.75	0.37	3.45 *
	ภายในกลุ่ม	117	12.72	0.11	
	รวม	119	13.47		
59. เจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นเชิงตำหนิว่าท่านหรือญาติ ๆ เป็นผู้ทำให้ผู้ป่วยเป็นโรคจิต	ระหว่างกลุ่ม	2	0.15	0.07	0.89
	ภายในกลุ่ม	117	9.55	0.08	
	รวม	119	9.70		
60. เจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นเชิงตำหนิว่าท่านหรือญาติ ๆ เป็นผู้ทำให้ผู้ป่วยป่วยซ้ำ	ระหว่างกลุ่ม	2	0.72	0.36	1.19
	ภายในกลุ่ม	117	35.15	0.30	
	รวม	119	35.87		
61. แพทย์และ/หรือพยาบาลไม่รับฟังข้อสังเกตของท่านเกี่ยวกับอาการของผู้ป่วย	ระหว่างกลุ่ม	2	0.08	0.04	0.17
	ภายในกลุ่ม	117	27.51	0.24	
	รวม	119	27.59		
ญ. ระบบบริการทางสุขภาพจิต					
62. หน่วยงานของรัฐไม่ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเท่าที่ควร	ระหว่างกลุ่ม	2	10.93	5.46	7.04 *
	ภายในกลุ่ม	117	90.77	0.78	
	รวม	119	101.70		

ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของรายละเอียดของแหล่งความเครียดของญาติผู้ป่วยโรคจิตเภทที่ป่วยมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ถึง 5 ปี 5.1 ถึง 10 ปี และ 10 ปีขึ้นไป (ต่อ)

แหล่งความเครียด	แหล่งความแปรปรวน	df	SS	MS	F
63. หน่วยงานของรัฐไม่ได้ฝึกอาชีพให้ผู้ป่วย	ระหว่างกลุ่ม	2	0.71	0.36	0.80
	ภายในกลุ่ม	117	52.28	0.45	
	รวม	119	52.99		
64. หน่วยงานไม่มีการให้ความรู้แก่ญาติเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน	ระหว่างกลุ่ม	2	0.75	0.37	0.93
	ภายในกลุ่ม	117	46.72	0.40	
	รวม	119	47.47		
65. เวลาผู้ป่วยมีอาการเกิดขึ้นอย่างฉุกเฉินต้องเดินทางไกลเพื่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน	ระหว่างกลุ่ม	2	2.89	1.44	0.98
	ภายในกลุ่ม	117	173.10	1.48	
	รวม	119	175.99		
66. ไม่รู้จักหน่วยงานทางสุขภาพจิตที่อยู่ใกล้บ้านว่ามีที่ไต่ถาม	ระหว่างกลุ่ม	2	1.62	0.81	0.97
	ภายในกลุ่ม	117	98.08	0.84	
	รวม	119	99.70		
67. บริการนอกเวลาราชการไม่สะดวก	ระหว่างกลุ่ม	2	2.27	1.14	1.22
	ภายในกลุ่ม	117	109.72	0.94	
	รวม	119	111.99		
68. บริการในวันหยุดราชการไม่สะดวก	ระหว่างกลุ่ม	2	0.25	0.13	0.15
	ภายในกลุ่ม	117	97.45	0.83	
	รวม	119	97.70		

ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของรายละเอียดของแหล่งความเครียดของญาติผู้ป่วยโรคจิตเภทที่ป่วยมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ถึง 5 ปี 5.1 ถึง 10 ปี และ 10 ปีขึ้นไป (ต่อ)

แหล่งความเครียด	แหล่งความแปรปรวน	df	SS	MS	F
69. ไม่ทราบขั้นตอนของการขอรับบริการ	ระหว่างกลุ่ม	2	0.18	0.09	0.11
	ภายในกลุ่ม	117	99.29	0.85	
	รวม	119	99.47		
70. ทางโรงพยาบาลดูแลผู้ป่วยไม่ทั่วถึง เป็นเหตุให้ผู้ป่วยหลบหนีออกจากโรงพยาบาลก่อนที่จะมีอาการทุเลาพอที่จะอยู่ที่บ้านได้	ระหว่างกลุ่ม	2	0.08	0.04	0.06
	ภายในกลุ่ม	117	75.39	0.64	
	รวม	119	75.47		
71. ทางโรงพยาบาลจำหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลเร็วเกินไป ขณะที่อาการผู้ป่วยยังไม่ทุเลา	ระหว่างกลุ่ม	2	4.29	2.14	2.69
	ภายในกลุ่ม	117	93.41	0.80	
	รวม	119	97.70		
72. การให้บริการที่โรงพยาบาลล่าช้า	ระหว่างกลุ่ม	2	0.06	0.03	0.04
	ภายในกลุ่ม	117	91.81	0.78	
	รวม	119	91.87		

$$*F_{.95}(2,117) = 3.07$$

จากตารางที่ 12 ปรากฏว่า คะแนนเฉลี่ยแต่ละข้อของแหล่งความเครียดของญาติผู้ป่วยโรคจิตเภทที่ป่วยมาแล้วเป็นระยะเวลาต่างกัน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 10 ข้อ คือ "ขาดรายได้จากการประกอบอาชีพของผู้ป่วย"

"ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูผู้ป่วยที่บ้าน" "คิดว่าการมีญาติป่วยเป็นโรคจิตทำให้เสียชื่อเสียงเกียรติยศ" "คิดว่าการเลี้ยงดูหรือการปฏิบัติของญาติที่ผู้ป่วยมีส่วนทำให้ผู้ป่วยป่วยเป็นโรคจิต" "คิดว่าผู้ป่วยคงไม่ป่วยเป็นโรคจิต ถ้าญาติได้รับพาไปรักษาตั้งแต่เริ่มมีอาการผิดปกติ" "กังวลว่าในอนาคตผู้ป่วยจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไร" "ญาติกลัวว่าผู้ป่วยจะถูกหลอกหลวงเรื่องเพศ" "เจ้าหน้าที่ตอบคำถามไม่กระจ่างชัด" "การซักถามซ้ำ ๆ เกี่ยวกับประวัติความเจ็บป่วยของผู้ป่วยจากเจ้าหน้าที่หลายคน" และ "หน่วยงานของรัฐไม่ได้ช่วยดูแลผู้ป่วยเท่าที่ควร"



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ตารางที่ 13

ผลการทดสอบความแตกต่างแต่ละคู่ โดยวิธี Least Significant Difference (LSD) ของคะแนนเฉลี่ย รายละเอียดแหล่งความเครียด ของญาติผู้ป่วยโรคจิตเภทที่ป่วยมาแล้วเป็นระยะเวลาต่างกัน เฉพาะที่การวิเคราะห์ความแปรปรวนที่ระดับความมีนัยสำคัญ .05 ปรากฏว่า มีความแตกต่างจำนวน 10 ข้อ ตามตารางที่ 12

แหล่งความเครียดและระยะเวลาที่ป่วยรายคู่	N	\bar{X}	S.D.	$(\bar{X}_i - \bar{X}_j)$	lsd
1. ชาครายได้จากประกอบอาชีพของผู้ป่วย					
1 - 5 ปี	39	1.74	1.07	0.63*	0.50
5.1 - 10 ปี	38	2.37	1.10		
1 - 5 ปี	39	1.74	1.07	0.02	0.48
10 ปีขึ้นไป	43	1.72	1.12		
5.1 - 10 ปี	38	2.37	1.10	0.65*	0.48
10 ปีขึ้นไป	43	1.72	1.12		
2. ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูผู้ป่วยที่บ้าน					
1 - 5 ปี	39	1.87	.98	0.45	0.50
5.1 - 10 ปี	38	2.32	1.16		
1 - 5 ปี	39	1.87	.98	0.15	0.48
10 ปีขึ้นไป	43	1.72	1.14		
5.1 - 10 ปี	38	2.32	1.16	0.60*	0.48
10 ปีขึ้นไป	43	1.72	1.14		

ตารางที่ 13 ผลการทดสอบความแตกต่างแต่ละคู่ โดยวิธี Least Significant Difference (LSD) ของคะแนนเฉลี่ย รายละเอียดของความเครียด ของญาติผู้ป่วยโรคจิตเภทที่ป่วยมาแล้วเป็นระยะเวลาต่างกัน เฉพาะที่การวิเคราะห์ความแปรปรวนที่ระดับความมีนัยสำคัญ .05 ปรากฏว่า มีความแตกต่างจำนวน 10 ข้อ ตามตารางที่ 12 (ต่อ)

แหล่งความเครียดและ ระยะเวลาที่ป่วยรายคู่	N	\bar{X}	S.D.	$(\bar{X}_i - \bar{X}_j)$	lsd
3. คิดว่าการมีญาติป่วยเป็นโรคจิต ทำให้ เสียชื่อเสียงเกียรติยศ					
1 - 5 ปี	39	1.41	.82	0.43*	0.42
5.1 - 10 ปี	38	1.84	1.17		
1 - 5 ปี	39	1.41	.82	0.04	0.41
10 ปีขึ้นไป	43	1.37	.76		
5.1 - 10 ปีขึ้นไป	38	1.84	1.17	0.47*	0.41
10 ปีขึ้นไป	43	1.37	.76		
4. คิดว่าการเลี้ยงดูหรือการปฏิบัติของท่าน ต่อผู้ป่วยมีส่วนทำให้ผู้ป่วยป่วยเป็นโรคจิต					
1 - 5 ปี	39	1.56	.97	0.17	0.33
5.1 - 10 ปี	38	1.39	.79		
1 - 5 ปี	39	1.56	.97	0.49*	0.32
10 ปีขึ้นไป	43	1.07	.34		
5.1 - 10 ปี	38	1.39	.79	0.32	0.32
10 ปีขึ้นไป	43	1.07	.34		

ตารางที่ 13 ผลการทดสอบความแตกต่างแต่ละคู่ โดยวิธี Least Significant Difference (LSD.) ของคะแนนเฉลี่ย รายละเอียดแหล่งความเครียด ของญาติผู้ป่วยโรคจิตเภทที่ป่วยมาแล้วเป็นระยะเวลาต่างกัน เฉพาะที่การวิเคราะห์ความแปรปรวนที่ระดับความมีนัยสำคัญ .05 ปรากฏว่า มีความแตกต่างจำนวน 10 ข้อ ตามตารางที่ 12 (ต่อ)

แหล่งความเครียดและระยะเวลาที่ป่วยรายคู่	N	\bar{X}	S.D.	$(\bar{X}_i - \bar{X}_j)$	lsd.
5. คิดว่าผู้ป่วยคงไม่ป่วยเป็นโรคจิต ถ้าท่านได้รับผู้ป่วยไปรักษาตั้งแต่เริ่มมีอาการผิดปกติ					
1 - 5 ปี	39	2.00	1.28	0.21	0.51
5.1 - 10 ปี	38	1.79	1.23		
1 - 5 ปี	39	2.00	1.28	0.63*	0.49
10 ปีขึ้นไป	43	1.37	.82		
5.1 - 10 ปี	38	1.79	1.23	0.42	0.49
10 ปีขึ้นไป	43	1.37	.82		
6. กังวลว่าในอนาคตผู้ป่วยจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไร					
1 - 5 ปี	39	2.90	1.14	0.39	0.51
5.1 - 10 ปี	38	3.29	.96		
1 - 5 ปี	39	2.90	1.14	0.32	0.50
10 ปีขึ้นไป	43	2.58	1.28		

ตารางที่ 13 ผลการทดสอบความแตกต่างแต่ละคู่ โดยวิธี Least Significant Difference (LSD.) ของคะแนนเฉลี่ย รายละเอียดแหล่งความเครียด ของญาติผู้ป่วยโรคจิตเภทที่ป่วยมาแล้วเป็นระยะเวลาต่างกัน เฉพาะที่การวิเคราะห์ความแปรปรวนที่ระดับความมีนัยสำคัญ .05 ปรากฏว่า มีความแตกต่างจำนวน 10 ข้อ ตามตารางที่ 12 (ต่อ)

แหล่งความเครียดและระยะเวลาที่ป่วยรายคู่	N	\bar{X}	S.D.	$(\bar{X}_i - \bar{X}_j)$	lsd.
5.1 - 10 ปี	38	3.29	.96	0.71*	0.50
10 ปีขึ้นไป	43	2.58	1.28		
7. ท่านกลัวว่าผู้ป่วยจะถูกหลอกหลวงเรื่องเพศ					
1 - 5 ปี	39	1.77	1.16	0.36	0.53
5.1 - 10 ปี	38	2.13	1.38		
1 - 5 ปี	39	1.77	1.16	0.35	0.52
10 ปีขึ้นไป	43	1.42	.98		
5.1 - 10 ปี	38	2.13	1.38	0.71*	0.52
10 ปีขึ้นไป	43	1.42	.98		
8. เจ้าหน้าที่ตอบคำถามไม่กระจ่างชัด					
1 - 5 ปี	39	1.36	.74	0.31*	0.23
5.1 - 10 ปี	38	1.05	.32		

ตารางที่ 13 ผลการทดสอบความแตกต่างแต่ละคู่ โดยวิธี Least Significant Difference (LSD) ของคะแนนเฉลี่ย รายละเอียดแหล่งความเครียด ของญาติผู้ป่วยโรคจิตเภทที่ป่วยมาแล้วเป็นระยะเวลาต่างกัน เฉพาะที่การวิเคราะห์ความแปรปรวนที่ระดับความมีนัยสำคัญ .05 ปรากฏว่า มีความแตกต่างจำนวน 10 ข้อ ตามตารางที่ 12 (ต่อ)

แหล่งความเครียดและระยะเวลาที่ป่วยรายคู่	N	\bar{X}	S.D.	$(\bar{X}_i - \bar{X}_j)$	lsd.
1 - 5 ปี	39	1.36	.74	0.24*	0.23
10 ปีขึ้นไป	43	1.12	.39		
5.1 - 10 ปี	38	1.05	.32	0.07	0.23
10 ปีขึ้นไป	43	1.12	.39		
9. การซักถามซ้ำ ๆ เกี่ยวกับประวัติความเจ็บป่วยของผู้ป่วยจากเจ้าหน้าที่หลายคน					
1 - 5 ปี	39	1.18	.56	0.15*	0.14
5.1 - 10 ปี	38	1.03	.16		
1 - 5 ปี	39	1.18	.56	0.18*	0.14
10 ปีขึ้นไป	43	1.00	.00		
5.1 - 10 ปี	38	1.03	.16	0.03	0.14
10 ปีขึ้นไป	43	1.00	.00		

ตารางที่ 13 ผลการทดสอบความแตกต่างแต่ละคู่ โดยวิธี Least Significant Difference (LSD) ของคะแนนเฉลี่ย รายละเอียดแหล่งความเครียดของญาติผู้ป่วยโรคจิตเภทที่ป่วยมาแล้วเป็นระยะเวลาต่างกัน เฉพาะที่การวิเคราะห์ความแปรปรวนที่ระดับความมีนัยสำคัญ .05 ปรากฏว่า มีความแตกต่างจำนวน 10 ข้อ ตามตารางที่ 12 (ต่อ)

แหล่งความเครียดและระยะเวลาที่ป่วยรายคู่	N	\bar{X}	S.D.	$\bar{X}_i - \bar{X}_j$	lsd.
10. หน่วยงานของรัฐไม่ได้อาวยุคและผู้ป่วยเท่าที่ควร					
1 - 5 ปี	39	1.13	.52	0.21	0.40
5.1 - 10 ปี	38	1.34	.81		
1 - 5 ปี	39	1.13	.52	0.71*	0.39
10 ปีขึ้นไป	43	1.84	1.15		
5.1 - 10 ปี	38	1.34	.81	0.50*	0.39
10 ปีขึ้นไป	43	1.84	1.15		

จากตารางที่ 13 เมื่อทดสอบต่อไปว่ามีชนิดของรายละเอียดแหล่งความเครียดของญาติผู้ป่วยโรคจิตเภทที่ป่วยมาแล้วเป็นระยะเวลาต่างกัน มีคู่ใดบ้างที่แตกต่างกัน โดยวิธี Least Significant Difference (LSD) ที่ระดับความมีนัยสำคัญ .05 ปรากฏว่า ญาติของผู้ป่วยที่ป่วยมาแล้ว 1 ถึง 5 ปี มีคะแนนเฉลี่ยของความเครียดสูงกว่าญาติของผู้ป่วยที่ป่วยมาแล้ว 10 ปีขึ้นไป 4 ข้อ คือ "คิดว่าอาการเล็ยงหรือการปฏิบัติของญาติต่อผู้ป่วยมีส่วนทำให้ผู้ป่วยป่วยเป็นโรคจิต" "คิดว่าผู้ป่วยคงไม่ป่วยเป็นโรคจิต ถ้าญาติได้รับพาไปรักษาตั้งแต่เริ่มมีอาการผิดปกติ" "เจ้าหน้าที่ตอบคำถามไม่กระจ่างชัด" และ "การซักถามซ้ำ ๆ เกี่ยวกับ

ประวัติความเจ็บป่วยของผู้ป่วยจากเจ้าหน้าที่หลายคน"

ญาติของผู้ป่วยที่ป่วยมาแล้ว 5.1 ถึง 10 ปี มีคะแนนเฉลี่ยความเครียดสูงกว่าญาติของผู้ป่วยที่ป่วยมาแล้ว 10 ปีขึ้นไป 5 ข้อ คือ "การขาดรายได้จากการประกอบอาชีพของผู้ป่วย" "ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูผู้ป่วยที่บ้าน" "คิดว่าการมีญาติป่วย เป็นโรคจิตทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติยศ" "กังวลว่าในอนาคตผู้ป่วยจะดำรงชีวิตต่อไปอย่างไร" และ "ญาติกลัวว่าผู้ป่วยจะถูกหลอกลวงเรื่องเพศ"

ญาติของผู้ป่วยที่ป่วยมาแล้ว 5.1 ถึง 10 ปี มีคะแนนเฉลี่ยความเครียดสูงกว่าญาติของผู้ป่วยที่ป่วยมาแล้ว 1 ถึง 5 ปี 2 ข้อ คือ "การขาดรายได้จากการประกอบอาชีพของผู้ป่วย" และ "คิดว่าการมีญาติป่วย เป็นโรคจิตทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติยศ"

ญาติของผู้ป่วยที่ป่วยมาแล้ว 1 ถึง 5 ปี มีคะแนนเฉลี่ยความเครียดสูงกว่าญาติของผู้ป่วยที่ป่วยมาแล้ว 5.1 ถึง 10 ปี 2 ข้อ คือ "เจ้าหน้าที่ตอบคำถามไม่กระจ่างชัด" และ "การซักถามซ้ำ ๆ เกี่ยวกับประวัติความเจ็บป่วยของผู้ป่วยจากเจ้าหน้าที่หลายคน"

และญาติของผู้ป่วยที่ป่วยมาแล้ว 10 ปีขึ้นไป มีคะแนนเฉลี่ยความเครียดสูงกว่าญาติของผู้ป่วยที่ป่วยมาแล้ว 1 ถึง 5 ปี และ 5.1 ถึง 10 ปี ในเรื่อง "หน่วยงานของรัฐไม่ได้ช่วยเหลือผู้ป่วยเท่าที่ควร"

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย