

ผลการวิจัย

การศึกษาความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนิสิตชาย
ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2533 ในช่วงเวลานิสิตลงทะเบียนที่สำนัก
ทะเบียนกำหนด เมื่อวันที่ 24-25 ตุลาคม 2533 จากการศึกษาครั้งนี้
สามารถแบ่งผลของการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 5 หมวดใหญ่ คือ

- หมวดที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
- หมวดที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับนิสิตสูบบุหรี่ ไม่สูบบุหรี่
- หมวดที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับ ความรู้ ทักษะ และปัจจัยบางประการ
- หมวดที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูบบุหรี่
- หมวดที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ไม่สูบบุหรี่

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมวดที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน

จากการแจกแบบสอบถามจำนวน 4,525 ชุด ได้รับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม จำนวน 3,600 ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 79.55

ตารางที่ 1.1 แสดงจำนวนและร้อยละของจำนวนนิสิตชายที่ตอบแบบสอบถามจำแนกตามคณะ

คณะ	จำนวนนิสิตชายทั้งหมด	จำนวนแบบสอบถามที่ได้รับ	%ของการตอบฯ	
			ของนิสิตชายในคณะ	ของคณะต่างๆ
1. ครุศาสตร์	399	194	48.6	5.4
2. ทันตแพทยศาสตร์	209	130	62.2	3.6
3. นิติศาสตร์	326	149	45.7	4.1
4. นิเทศศาสตร์	113	75	66.4	2.1
5. พาณิชยศาสตร์และการบัญชี	648	372	57.4	10.3
6. แพทยศาสตร์	676	362	53.6	10.1
7. เกษัตริศาสตร์	336	145	43.2	4.0
8. รัฐศาสตร์	330	163	49.4	4.5
9. วิทยาศาสตร์	644	367	57.0	10.2
10. วิศวกรรมศาสตร์	2164	1101	50.8	30.6
11. ศิลปกรรมศาสตร์	193	78	40.4	2.2
12. เศรษฐศาสตร์	242	110	45.5	3.1
13. สถาปัตยกรรมศาสตร์	332	155	46.6	4.3
14. สัตวแพทยศาสตร์	381	159	41.7	4.4
15. อักษรศาสตร์	107	40	37.4	1.1
รวมทั้งสิ้น	7100	3600	50.7	100.0

ตารางที่ 1.1 แสดงถึงคณะต่าง ๆ ที่ส่งแบบสอบถามกลับคืน เป็นแบบสอบถามที่มาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มากที่สุด ร้อยละ 30.6 รองลงมาเป็นคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี วิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ ร้อยละ 10.3, 10.2, 10.1 ตามลำดับ คณะที่มีแบบสอบถามกลับคืนน้อยที่สุดคือ คณะอักษรศาสตร์ ร้อยละ 1.1 นอกเหนือจากนั้นได้จากคณะอื่นๆ ที่เหลือในอัตราร้อยละ 2.1 ถึง 5.4

แต่เมื่อคิด เป็น เปอร์เซนต์ของนิสิตชาย ในแต่ละคณะที่ตอบแบบสอบถามแล้ว ประมาทได้ว่าเป็นครึ่งหนึ่งของนิสิตชายทั้งหมดในแต่ละคณะ ยกเว้นคณะอักษรศาสตร์ ซึ่งมีนิสิตตอบแบบสอบถามเพียง ร้อยละ 37.4 ของนิสิตชายทั้งหมดในคณะอักษรศาสตร์

ตารางที่ 1.2 แสดงจำนวนและร้อยละของนิสิตชายที่ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามชั้นปีการศึกษา

ปีการศึกษา	จำนวน	ร้อยละ
ชั้นปีที่ 1	962	26.7
ชั้นปีที่ 2	857	23.8
ชั้นปีที่ 3	715	19.9
ชั้นปีที่ 4	803	22.3
ชั้นปีที่ 5	158	4.4
ชั้นปีที่ 6	105	2.9
รวม	3600	100.0

ตารางที่ 1.2 แสดงแบบสอบถามที่ได้รับจากนิสิตชาย จำแนกตามชั้นปีการศึกษาพบว่าแบบสอบถามที่ได้มาจากชั้นปีที่ 1 มากที่สุด รองลงมาเป็นนิสิตชั้นปีที่ 2 ปีที่ 4 ปีที่ 3 และ ปีที่ 5, 6 ตามลำดับ

ตารางที่ 1.3 แสดงข้อมูลพื้นฐานของนิสิตชายที่ตอบแบบสอบถามจำแนกตาม
ลักษณะต่างๆ

ตัวแปร	จำนวน	ร้อยละ
1. สถานภาพสมรสของบิดามารดา		
- อยู่รวมกัน (คู่)	3037	84.5
- บิดาเสียชีวิต	269	7.5
- แยกกันอยู่	116	3.2
- หย่า	100	2.8
- มารดาเสียชีวิต	52	1.4
- ก้าวร้าวบิดามารดา	18	.5
รวม	3592	100.0
2. ภูมิลำเนาที่จบการศึกษามัธยมปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า		
- กรุงเทพฯ	2993	83.1
- ต่างจังหวัด	605	16.8
- ต่างประเทศ	2	.1
รวม	3600	100.0
3. ภูมิลำเนาของบิดามารดา		
- กรุงเทพฯ	2416	67.3
- ต่างจังหวัด	1170	32.6
- ต่างประเทศ	5	.1
รวม	3591	100.0

ตารางที่ 1.3 (ต่อ) แสดงข้อมูลพื้นฐานของนิสิตชายที่ตอบแบบสอบถาม
จำแนกตามลักษณะต่างๆ

ตัวแปร	จำนวน	ร้อยละ
4. การพักอาศัย		
- บิดา มารดา	2167	60.3
- หอพัก	518	14.4
- ญาติพี่น้อง	504	14.0
- มารดา	285	7.9
- บิดา	59	1.6
- วัด	12	.3
- อื่น ๆ (คอนโด)	48	1.3
รวม	3593	100.0
5. การรับเงินค่าใช้จ่าย		
- บิดา มารดา	3148	87.7
- ญาติพี่น้อง	143	4.0
- ทุนการศึกษา	79	2.2
- ทำงานนอกเวลา	52	1.4
- อื่นๆ (พระ)	21	.6
- ตอบมากกว่า 1 ข้อ	146	4.1
รวม	3589	100.0
6. ความเพียงพอของค่าใช้จ่าย		
- พอ	3082	85.9
- ไม่พอ	506	14.1
รวม	3588	100.0

ตารางที่ 1.3 (ต่อ) แสดงข้อมูลพื้นฐานของนิสิตชายที่ตอบแบบสอบถาม
จำแนกตามตามลักษณะต่างๆ

ตัวแปร	จำนวน	ร้อยละ
7. การเดินทางมามหาวิทยาลัย		
- รถเมล์	2185	61.1
- ขับรถมาเอง	604	16.9
- เดิน	380	10.6
- ผู้ปกครองมาส่ง	261	7.3
- ตอบมากกว่า 1 ข้อ	78	2.2
- อื่นๆ (รถรับจ้าง)	68	1.9
รวม	3576	100.0
8. ความเห็นเกี่ยวกับการอนุญาตนำบุตร		
ต่างประเทศ เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย		
- เห็นด้วย	864	25.3
- ไม่เห็นด้วย	2500	74.7
รวม	3346	100.0

จากตารางที่ 1.3 สถานภาพสมรสของบิดา มารดา ของนิสิตที่ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ คือ บิดา มารดา อยู่รวมกัน ร้อยละ 84.5

นิสิตร้อยละ 83.1 จะจบการศึกษามัธยมศึกษา (ม.6) จากโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร
จบจากต่างจังหวัดเพียงร้อยละ 16.8 และจบจากต่างประเทศ ร้อยละ 0.1

นิสิตส่วนใหญ่ (ร้อยละ 67.3) บิดามารดาจะมีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร
ที่บิดามารดามีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดมีร้อยละ 32.6 และต่างประเทศร้อยละ 0.1 นิสิต


ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 60.3 จะพักอาศัยอยู่กับบิดามารดา ที่พักกับญาติพี่น้องมีร้อยละ 14.0 และที่อยู่หอพักอีกร้อยละ 14.4

นิสิตร้อยละ 87.7 รับเงินค่าใช้จ่ายจากบิดามารดา รองลงมารับจากญาติ พี่น้องร้อยละ 4.0

ร้อยละ 85.9 นิสิตมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนที่เพียงพอ มีเพียงร้อยละ 14.1 ที่ตอบ ว่าไม่เพียงพอ

นิสิตส่วนใหญ่ (ร้อยละ 61.1) ขึ้นรถเมล์มามหาวิทยาลัย ร้อยละ 16.9 มา มหาวิทยาลัยโดยขับรถมาเอง

เกี่ยวกับการที่รัฐบาลอนุญาตให้นักบวชต่างชาติต่างประ เทศ เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย นิสิตที่เห็นด้วยร้อยละ 25.3 และไม่เห็นด้วยมีร้อยละ 74.7



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 1.4 แสดงจำนวน และร้อยละของนิสิตชาย จำแนกตามค่าใช้จ่ายที่ได้รับ

ค่าใช้จ่าย ต่อเดือน (บาท)	จำนวนนิสิต	
	จำนวน	ร้อยละ
<-1000	538	15.2
1001-2000	1974	55.7
2001-3000	746	21.0
3001-4000	151	4.2
4001-5000	91	2.6
5001-9999	29	.8
>10000	16	.5
รวม	3545	100.0

จากตารางที่ 1.4 พบว่านิสิตชายส่วนใหญ่ ร้อยละ 55.4 ได้รับเงินค่าใช้จ่ายต่อเดือน อยู่ระหว่าง 1001-2000 บาท ร้อยละ 21.0 ระหว่าง 2001-3000 บาท และมีเพียงร้อยละ 8.2 ที่ได้รับค่าใช้จ่ายสูงกว่า 3000 บาทต่อเดือน

ตารางที่ 1.5 แสดงจำนวนและร้อยละของนิสิตชาย จำแนกตามกลุ่มอายุ

อายุ (ปี)	จำนวนนิสิต	
	จำนวน	ร้อยละ
15 - 19	1580	44.0
20 - 24	1992	55.4
25 - 29	22	.6
รวม	3594	100.0

ตารางที่ 1.5 พบว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของนิสิตชายอยู่ในกลุ่มอายุ 20-24 ปี (ร้อยละ 55.4) รองลงมาได้แก่กลุ่มอายุ 15-19 ปี (ร้อยละ 44.0) และ 25-29 ปี มีเพียงร้อยละ .6 อายุเฉลี่ยของนิสิต ($\bar{x} + SD.$) อยู่ในช่วง $19.87 + 1.76$ อายุต่ำสุดคือ 15 ปี ซึ่งเป็นนิสิตสอบเทียบ อายุสูงสุด 28 ปี

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมวดที่ 2

ข้อมูลเกี่ยวกับนิสิตสูบบุหรี่ ไม่สูบบุหรี่

ตารางที่ 2.1 แสดงจำนวนและร้อยละของการสูบบุหรี่ ไม่สูบบุหรี่ จำแนกตามคณะ
ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะ	สูบบุหรี่		ไม่สูบบุหรี่	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
นิเทศศาสตร์	23	30.7	52	69.3
รัฐศาสตร์	46	28.2	117	71.8
ครุศาสตร์	53	27.3	141	72.7
ศิลปกรรมศาสตร์	18	23.1	60	76.9
สถาปัตยกรรมศาสตร์	35	22.6	120	77.4
นิติศาสตร์	30	20.1	119	79.9
อักษรศาสตร์	8	20.0	32	80.0
เศรษฐศาสตร์	17	15.5	93	84.5
สัตวแพทยศาสตร์	23	14.5	136	85.5
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี	53	14.2	319	85.8
วิศวกรรมศาสตร์	146	13.3	955	86.7
ทันตแพทยศาสตร์	13	10.0	117	90.0
วิทยาศาสตร์	36	9.8	331	90.2
แพทยศาสตร์	30	8.3	332	91.7
เภสัชศาสตร์	11	7.6	134	92.4
รวม	542	15.1	3058	84.9

ตารางที่ 2.1 พบว่าอัตราการสูบบุหรี่ของนิสิตแต่ละคณะ อยู่ในระหว่างร้อยละ 7.6 ถึง 30.7 คณะซึ่งอัตราการสูบบุหรี่ของนิสิตมากเป็นสามอันดับแรก คือ คณะ นิเทศศาสตร์ (ร้อยละ 30.7) รัฐศาสตร์ (ร้อยละ 28.2) และครุศาสตร์ (ร้อยละ 27.3) ตามลำดับ คณะซึ่งนิสิตมีการสูบบุหรี่ในอัตราน้อยกว่าร้อยละ 10 ได้แก่ คณะ เกษษศาสตร์ แพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คิดเป็นจำนวนร้อยละ 7.6, 8.3 และ 9.8 ตามลำดับ รวมทุกคณะ อัตราการสูบบุหรี่ของนิสิตชายคิดเป็นร้อยละ 15.1

ตารางที่ 2.2 แสดงจำนวน และร้อยละของนิสิตสูบ/ไม่สูบบุหรี่ จำแนกตามชั้นปีการศึกษา

ปีการศึกษา	สูบ		ไม่สูบ	
	จำนวน (542)	ร้อยละ	จำนวน (3058)	ร้อยละ
ชั้นปีที่ 1	102	10.6	860	89.4
ชั้นปีที่ 2	114	13.3	743	86.7
ชั้นปีที่ 3	127	17.8	588	82.2
ชั้นปีที่ 4	160	19.9	643	80.1
ชั้นปีที่ 5	21	13.3	137	86.7
ชั้นปีที่ 6	18	17.1	87	82.9

ตารางที่ 2.2 พบว่านิสิตชั้นปีที่ 1 มีเปอร์เซ็นต์ของการสูบบุหรี่น้อยที่สุด (ร้อยละ 10.6) และชั้นปีที่ 4 เปอร์เซ็นต์การสูบบุหรี่มากที่สุด (ร้อยละ 19.9) โดยที่ การสูบบุหรี่เพิ่มมากตามชั้นปี จากปีที่ 1 ถึง ปีที่ 4

- หมายเหตุ
1. ชั้นปีที่ 5 ได้แก่ นิสิตชายคณะ เกษษศาสตร์ แพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์ และสัตวแพทยศาสตร์
 2. ชั้นปีที่ 6 ได้แก่ นิสิตชายคณะ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์
สัตวแพทยศาสตร์

ตารางที่ 2.3 แสดงจำนวนและร้อยละของจำนวนนิสิตที่สูบ/ไม่สูบบุหรี่ จำแนกตามสถานภาพสมรสของบิดามารดา

สถานภาพสมรส ของบิดามารดา	สูบ		ไม่สูบ	
	จำนวน (541)	ร้อยละ	จำนวน (3051)	ร้อยละ
อยู่รวมกัน (คู่)	461	15.2	2576	84.4
หย่า	19	19.0	81	81.0
แยกกันอยู่	20	17.2	96	82.8
บิดาเสียชีวิต	33	12.3	236	87.7
มารดาเสียชีวิต	7	13.5	45	86.5
กำพร้าบิดามารดา	1	5.6	17	94.4

ตารางที่ 2.3 พบว่าอัตราการสูบบุหรี่ของนิสิตชาย ที่มีสถานภาพสมรสของบิดามารดา หย่าสูง (ร้อยละ 19.0) และที่มีสถานภาพสมรสของบิดามารดา แยกกันอยู่เป็นร้อยละ 17.2 ในขณะที่อัตราการสูบบุหรี่ของกลุ่มที่สถานภาพสมรสของบิดามารดาอยู่รวมกัน (คู่) เป็นร้อยละ 15.2

ตารางที่ 2.4 แสดงจำนวนและร้อยละของจำนวนนิสิตที่สอบ/ไม่สอบบุหรี จำแนกตาม สถานที่ตั้งโรงเรียนที่เรียนจบการศึกษามัธยมศึกษา (ม.6) หรือเทียบเท่า

จบการศึกษาจาก โรงเรียน	สอบ		ไม่สอบ	
	จำนวน (542)	ร้อยละ	จำนวน (3058)	ร้อยละ
กรุงเทพฯ	444	14.8	2549	85.2
ต่างจังหวัด	98	16.2	507	83.8
ต่างประเทศ	-	-	2	100.00

ตารางที่ 2.4 พบว่านิสิตที่จบการศึกษามัธยมศึกษา (ม.6) หรือเทียบเท่า จากโรงเรียนในกรุงเทพฯ ร้อยละ 14.8 สอบบุหรี ส่วนนิสิตที่จบการศึกษามัธยมศึกษาจาก โรงเรียนต่างจังหวัดร้อยละ 16.2 สอบบุหรี

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 2.5 แสดงจำนวนและร้อยละของจำนวนนิสิตที่สูบ/ไม่สูบบุหรี่ จำแนกตาม
ภูมิภาคตามมารดา

ภูมิภาคตามมารดา	สูบ		ไม่สูบ	
	จำนวน (541)	ร้อยละ	จำนวน (3050)	ร้อยละ
กรุงเทพฯ	350	14.5	2066	85.3
ต่างจังหวัด	190	16.2	980	83.8
ต่างประเทศ	1	20.0	4	80.0

ตารางที่ 2.5 พบว่านิสิตที่บิดา มารดามีภูมิลำเนา อยู่ในกรุงเทพฯ สูบบุหรี่ ร้อยละ 14.5 และที่อยู่ต่างจังหวัดสูบบุหรี่ร้อยละ 16.2

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 2.6 แสดงจำนวนและร้อยละของจำนวนนิสิตที่สูบ/ไม่สูบบุหรี่ จำแนกตาม การพักอาศัย

ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ	สูบ		ไม่สูบ	
	จำนวน (542)	ร้อยละ	จำนวน (3051)	ร้อยละ
บิดา มารดา	316	14.6	1851	85.4
บิดา	7	11.9	52	88.1
มารดา	35	12.3	250	87.7
ญาติพี่น้อง	75	14.9	429	88.1
วัด	5	41.7	7	58.3
หอพัก	96	17.5	422	81.5
อื่น ๆ (คอนโด)	8	16.7	40	83.3

ตารางที่ 2.6 พบว่านิสิตที่อาศัยอยู่ที่วัดมี เปอร์เซ็นต์การสูบบุหรี่สูงถึงร้อยละ 41.7 ในขณะที่นิสิตที่อาศัยอยู่กับบิดา มารดา หรือแหล่งอื่นมี เปอร์เซ็นต์การสูบบุหรี่ไม่ถึง ร้อยละ 20

ตารางที่ 2.7 แสดงจำนวนและร้อยละจำนวนนิสิตสูบ/ไม่สูบบุหรี่ จำแนกตามค่าใช้จ่าย ต่อเดือน

ค่าใช้จ่าย	สูบ		ไม่สูบ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
<1000	35	6.5	503	93.5
1001-2000	265	13.4	1709	86.6
2001-3000	155	20.8	591	79.2
3001-4000	40	26.5	111	73.5
4001-5000	32	35.2	59	64.8
5001-9900	4	13.8	25	86.2
>10000	5	31.2	11	68.8
รวม	536	15.1	3009	84.9

ตารางที่ 2.7 พบว่านิสิตกลุ่มที่ได้รับค่าใช้จ่ายต่อเดือนอยู่ระหว่าง 4001-5000 บาท มีอัตราการสูบบุหรี่สูงสุด (ร้อยละ 35.2) และในกลุ่มที่ได้รับค่าใช้จ่ายต่อเดือนต่ำกว่า 1000 บาท มีอัตราการสูบบุหรี่ต่ำสุด (ร้อยละ 6.5)

ตารางที่ 2.8 แสดงจำนวนและร้อยละของนิสิตที่สูบ/ไม่สูบบุหรี่ จำแนกตามแหล่งที่นิสิตได้รับเงินสำหรับใช้จ่ายต่อเดือน

แหล่งที่ นิสิตรับเงิน สำหรับค่าใช้จ่าย	สูบ		ไม่สูบ	
	จำนวน (539)	ร้อยละ	จำนวน (3050)	ร้อยละ
บิดา มารดา	459	14.6	2689	85.4
ญาติพี่น้อง	18	12.6	125	87.4
ทุนการศึกษา	11	13.9	68	86.1
ทำงานนอกเวลา	18	34.6	34	65.4
อื่นๆ (พระ)	2	9.5	19	90.5
ตอบมากกว่า 1 ข้อ	31	21.2	115	78.8

ตารางที่ 2.8 พบว่าในกลุ่มนิสิตที่ทำงานนอกเวลา มีอัตราการสูบบุหรี่สูงสุด (ร้อยละ 34.6) ในขณะที่กลุ่มที่ได้รับเงินจากพระ มีอัตราการสูบบุหรี่ต่ำสุด (ร้อยละ 9.5) ส่วนนิสิตที่ได้รับเงินค่าใช้จ่ายจากแหล่งอื่น มีอัตราการสูบบุหรี่อยู่ระหว่าง ร้อยละ 12.6 - 21.2

ตารางที่ 2.9 แสดงจำนวนและร้อยละของนิสิตที่สูบ/ไม่สูบบุหรี่ จำแนกตามความ
เพียงพอของค่าใช้จ่าย

ความเพียงพอ ของค่าใช้จ่าย	สูบ		ไม่สูบ	
	จำนวน (538)	ร้อยละ	จำนวน (3050)	ร้อยละ
พอ	405	13.1	2677	86.9
ไม่พอ	133	26.3	373	73.7

ตารางที่ 2.9 พบว่านิสิตที่มีค่าใช้จ่ายเพียงพอสูบบุหรี่ร้อยละ 13.1 ในขณะที่
นิสิตที่มีค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ สูบบุหรี่ร้อยละ 26.3

ตารางที่ 2.10 แสดงจำนวนและร้อยละกลุ่มนิสิตที่สูบ/ไม่สูบบุหรี่ จำแนกตามการเดิน
ทางมหาวิทยาลัย

การเดินทาง	สูบ		ไม่สูบ	
	จำนวน (535)	ร้อยละ	จำนวน (3041)	ร้อยละ
ขับรถมาเอง	136	22.5	468	77.5
ผู้ปกครองมาส่ง	32	12.3	229	87.7
รถเมล์	272	12.4	1913	87.6
เดิน	68	17.9	312	82.1
อื่นๆ (รถรับจ้าง)	10	14.7	58	85.3
ตอบมากกว่า 1 ข้อ	17	21.8	61	78.2

ตารางที่ 2.10 พบว่านิสิตกลุ่มที่สูบบุหรี่เดินทางมาเรียนที่มหาวิทยาลัย โดยการขับรถมาเองมีอัตราการสูบบุหรี่สูงสุด (ร้อยละ 22.5) ในขณะที่กลุ่มที่ผู้ปกครองมาส่งมีอัตราการสูบบุหรี่ต่ำสุด (ร้อยละ 12.3)

ตารางที่ 2.11 แสดงร้อยละของความเห็นเกี่ยวกับการอนุญาตนำบุหรี่ต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย ในนิสิตกลุ่มที่สูบและไม่สูบบุหรี่

ความเห็น	สูบ		ไม่สูบ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
เห็นด้วย	289	58.4	557	19.5
ไม่เห็นด้วย	206	41.6	2294	80.5
รวม	495	100.0	2851	1000

ตารางที่ 2.11 พบว่ากลุ่มนิสิตสูบบุหรี่มีความเห็นด้วยถึงร้อยละ 58.4 กับการอนุญาตนำบุหรี่ต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย ในขณะที่กลุ่มนิสิตที่ไม่สูบเห็นด้วยกับการอนุญาตนำบุหรี่ต่างประเทศเข้ามาจำหน่ายเพียงร้อยละ 19.5

ตารางที่ 2.12 แสดงจำนวนและร้อยละจำนวนนิสิตสูบ/ไม่สูบบุหรี่ จำแนกตามกลุ่มอายุ

อายุ (ปี)	สูบ		ไม่สูบ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
15 - 19	177	11.2	1403	88.8
20 - 24	363	18.2	1629	81.8
25 - 29	2	9.1	20	90.9
รวม	542	15.1	3052	84.9

ตารางที่ 2.12 และ 2.13 พบว่ากลุ่มอายุ 20-24 มีอัตราการสูบบุหรี่สูงสุด (ร้อยละ 18.2) รองลงมาคือกลุ่มอายุ 15-19 ปี (ร้อยละ 11.2) และ 25-29 ปี (ร้อยละ 9.1) ตามลำดับ จากรูปภาพที่ 1 ซึ่งได้แสดงแนวโน้มของอัตราการสูบบุหรี่ตามอายุของนิสิต ซึ่งสูงขึ้นเป็นรายปี โดยทั่วไปจะพบว่า นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้น มีช่วงอายุส่วนใหญ่ 17-24 ปี และอัตราการสูบบุหรี่จากอายุ < 17 มีอัตราการสูบร้อยละ 6.30 และสูงขึ้นทุกปี จนกระทั่งสูงขึ้นจนสูงที่สุดอายุ 24 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.8

หมวดที่ 3

ข้อมูลเกี่ยวกับ ความรู้ ทักษะ และปัจจัยบางประการ

ตารางที่ 3.1 แสดงจำนวนและร้อยละของความรู้เกี่ยวกับบุหรีมีส่วน เกี่ยวข้องหรือ เป็นสาเหตุสำคัญของโรค จำแนกตามการสูบ/ไม่สูบบุหรี

บุหรีมีส่วน เกี่ยวข้อง หรือ เป็นสาเหตุสำคัญของโรค	จำนวน	ร้อยละ ระดับความรู้					รวม ความรู้ 1-4 (%)	
		0	1	2	3	4		
1. โรคหลอดลมอักเสบ เรื้อรัง	สูบ	532	7.3	6.8	17.3	20.1	48.5	92.7
	ไม่สูบ	3022	1.1	2.6	11.0	22.0	63.3	98.9
2. โรคถุงลมโป่งพอง	สูบ	538	7.1	5.8	16.0	19.0	52.2	92.9
	ไม่สูบ	3041	1.1	2.8	10.2	17.9	68.0	98.9
3. โรคมะเร็งปอด	สูบ	539	6.1	3.7	13.9	19.1	57.1	93.9
	ไม่สูบ	3046	.9	1.2	5.6	15.6	76.8	99.1
4. โรคเส้นเลือดหัวใจตีบตัน	สูบ	537	8.8	11.5	20.3	21.0	38.4	91.2
	ไม่สูบ	3032	3.1	6.1	16.5	22.6	51.7	96.9

0 = ไม่เกี่ยวข้อง (ไม่รู้) 1 = เกี่ยวข้องน้อย 2 = เกี่ยวข้องปานกลาง
3 = เกี่ยวข้องมาก 4 = เกี่ยวข้องมากที่สุด

จากตารางที่ 3.1 พบว่านิสิตที่สูบและไม่สูบบุหรีมีความรู้ว่่าบุหรีมีส่วน เกี่ยวข้อง หรือ เป็นสาเหตุสำคัญของโรคหลอดลมอักเสบ เรื้อรังมากที่สุดร้อยละ 48.5 และ 63.3 ตามลำดับ เกี่ยวกับโรคถุงลมโป่งพอง ผู้สูบและไม่สูบบุหรีตอบว่าเกี่ยวข้องมากที่สุดร้อยละ 52.2 และ 68.0 เกี่ยวกับโรคมะเร็งปอด ผู้สูบและไม่สูบบุหรีตอบว่าเกี่ยวข้องมากที่สุดร้อยละ

57.7 และ 76.8 และโรคเส้นเลือดหัวใจตีบตัน ผู้สูบบุหรี่และไม่สูบบุหรี่ตอบว่าเกี่ยวข้องกับมากที่สุดเพียง 38.4 และ 51.7 และจะเห็นได้ว่ากลุ่มไม่สูบบุหรี่นั้น จะมีความรู้ว่าการสูบบุหรี่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นสาเหตุสำคัญของโรคทั้ง 4 โรค ทั้งในระดับมีความรู้ที่ดี และในระดับมีความรู้รวมทุกระดับสูงกว่ากลุ่มที่สูบบุหรี่

ตารางที่ 3.2 แสดงจำนวนและร้อยละของความรู้เกี่ยวกับความรุนแรงของโรค
จำแนกตามการสูบบุหรี่และไม่สูบบุหรี่

ความรู้เกี่ยวกับความรุนแรงของโรค		จำนวน	ขนาดของความรุนแรง		
			มากขึ้น	เท่าเดิม	น้อยลง
1. จำนวนบุหรี่ที่สูบต่อวันยิ่งมากขึ้น					
โอกาสของการเกิดโรคจากพิษของบุหรี่เป็นอย่างไร	สูบบุหรี่	542	86.5	11.4	2.0
	ไม่สูบบุหรี่	3045	95.6	3.4	1.0
2. ระยะเวลาที่สูบติดต่อกันมา					
นานขึ้นโอกาสของการเกิดโรคเป็นอย่างไร	สูบบุหรี่	539	88.7	9.5	1.9
	ไม่สูบบุหรี่	3040	95.3	3.9	.8
3. ผู้ที่ติดบุหรี่แล้วเลิกได้ยิ่งเลิก					
ได้นานเท่าใดโอกาสของการเกิดมะเร็งปอดจะเป็นอย่างไร	สูบบุหรี่	542	15.9	26.9	57.2
	ไม่สูบบุหรี่	3040	15.6	19.0	65.4
4. การได้รับควันบุหรี่เป็นประจำ					
ของเด็กในบ้านจะทำให้เป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจเป็นอย่างไร	สูบบุหรี่	540	83.3	13.5	3.1
	ไม่สูบบุหรี่	3044	94.3	4.5	1.2

ตารางที่ 3.3 แสดงจำนวนและร้อยละของคะแนนถูกผิดของความรู้เกี่ยวกับความรุนแรงของโรค จำแนกตามการสูบ/ไม่สูบบุหรี่

ความรู้เกี่ยวกับความรุนแรงของโรค	จำนวน	คะแนน	
		ถูก	ผิด
1. จำนวนบุหรี่ที่สูบต่อวันยิ่งมากขึ้น			
โอกาสของการเกิดโรคจากพิษของบุหรี่เป็นอย่างไร	สูบ 542 ไม่สูบ 3045	86.5 95.6	13.5 4.4
2. ระยะเวลาที่สูบติดต่อกันมา ยิ่งนานขึ้นโอกาสของการเกิดโรคเป็นอย่างไร	สูบ 539 ไม่สูบ 3040	88.7 95.3	11.3 4.7
3. ผู้ที่ติดบุหรี่แล้ว เลิกได้ยิ่ง เลิกได้นานเท่าใดโอกาสของการเกิดมะเร็งปอดจะเป็นอย่างไร	สูบ 542 ไม่สูบ 3040	57.2 65.4	42.8 34.6
4. การได้รับควันบุหรี่เป็นประจำของเด็กในบ้านจะทำให้เป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจจะเป็นอย่างไร	สูบ 540 ไม่สูบ 3044	83.3 94.3	16.7 5.7

ตารางที่ 3.4 แสดงผลรวมของคะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับความรุนแรงของโรค
จำแนกตามผู้สูบบุหรี่และไม่สูบบุหรี่

ความรุนแรง ของโรค	สูบบุหรี่		ไม่สูบบุหรี่		t-Value	p-Value		
	MEAN	S.D.	จำนวน	MEAN			S.D.	จำนวน
ผลรวมความรุนแรงของโรค	3.16	1.10	537	3.50	.76	3032	-6.98	.000**

** มีนัยสำคัญทางสถิติอย่างสูง (P < .01)

ตารางที่ 3.2, 3.3 และ 3.4 พบว่าความรู้เกี่ยวกับจำนวนบุหรี่ที่สูบต่อวันยิ่งมากขึ้นโอกาสของการเกิดโรคจากพิษของบุหรี่ยิ่งมากขึ้นนั้น ทั้งผู้สูบบุหรี่และไม่สูบบุหรี่ ตอบถูกร้อยละ 86.5 และ ร้อยละ 95.3 ตามลำดับ ต่อคำถามว่าระยะเวลาที่สูบติดต่อกันมานานขึ้นเท่าใดโอกาสเกิดโรคมะเร็งยิ่งมากขึ้น ทั้ง 2 กลุ่ม ตอบถูกร้อยละ 88.7 และ 95.3 ตามลำดับ ต่อคำถามว่าผู้ที่เคยสูบบุหรี่แล้วเลิกได้ ยิ่งเลิกได้นานเท่าใดโอกาสของการเกิดมะเร็งปอดจะน้อยลง ผู้สูบบุหรี่ตอบถูก ร้อยละ 57.2 กลุ่มผู้ไม่สูบบุหรี่ตอบถูกร้อยละ 65.4 และคำถามว่าการได้รับควันบุหรี่เป็นประจำของเด็กในบ้าน จะทำให้เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจมากขึ้น ผู้สูบบุหรี่และไม่สูบบุหรี่ ตอบถูกร้อยละ 83.3 และ 94.3 ตามลำดับ และมีความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยในเรื่องความรุนแรงของโรค อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P < .01) $t = -6.98$

ตารางที่ 3.5 แสดงร้อยละของทัศนคติที่มีต่อการสูบบุหรี่ จำแนกตามการสูบบุหรี่และไม่สูบบุหรี่

ทัศนคติเกี่ยวกับการสูบบุหรี่	จำนวน	คะแนนความเห็น (%)				
		1	2	3	4	5
1. การสูบบุหรี่เพียงเล็กน้อยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	สูบบุหรี่ 541 ไม่สูบบุหรี่ 3051	34.2 65.8	12.4 9.9	22.7 13.5	16.3 5.9	14.4 4.9
2. การสูบบุหรี่ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดของจิตใจ	สูบบุหรี่ 541 ไม่สูบบุหรี่ 3050	15.2 57.7	11.3 13.5	23.3 16.8	25.0 7.6	25.3 4.4
3. การสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ เป็นสิทธิส่วนบุคคล	สูบบุหรี่ 540 ไม่สูบบุหรี่ 3048	35.6 67.0	17.0 9.8	18.0 11.6	12.6 5.3	16.9 6.2
4. การสูบบุหรี่ทำให้เข้าสังคมได้ง่าย	สูบบุหรี่ 535 ไม่สูบบุหรี่ 3037	38.5 71.4	22.1 13.4	21.1 9.3	10.5 3.5	7.9 2.4
5. บุหรี่มีสารให้โทษต่อร่างกาย การสูบบุหรี่จึงเป็นอันตรายต่อสุขภาพและไม่ควรสูบบุหรี่	สูบบุหรี่ 541 ไม่สูบบุหรี่ 3054	12.2 7.4	10.0 2.0	17.7 3.8	16.3 8.9	43.8 77.8
6. เป็นภาวะน่ารำคาญที่อยู่ใกล้คนกำลังสูบบุหรี่	สูบบุหรี่ 541 ไม่สูบบุหรี่ 3047	14.4 6.2	10.9 2.8	17.0 5.4	20.0 10.6	37.7 75.2
7. การได้รับควันบุหรี่บ่อยๆ อาจทำให้คนข้างเคียงเกิดโรคหลอดเลือดอีกเสบเร็วหรือมะเร็งได้	สูบบุหรี่ 541 ไม่สูบบุหรี่ 3054	11.3 5.1	11.3 3.1	17.6 9.0	23.5 19.1	36.4 63.7
8. คนสูบบุหรี่จะมีกลิ่นติดตัว เป็นที่น่ารังเกียจ	สูบบุหรี่ 541 ไม่สูบบุหรี่ 3051	20.9 7.3	14.2 7.1	20.1 16.1	18.1 16.8	26.6 52.7

ข้อ 1-4 ทัศนคติเชิงลบ

ข้อ 5-8 ทัศนคติเชิงบวก

1 = ไม่เห็นด้วย ----- 5 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง

ตารางที่ 3.5 พบว่านิสิตมีทัศนคติเรื่องการสูบบุหรี่เพียงเล็กน้อยไม่เป็นอัน
 ันตรายต่อสุขภาพ กลุ่มผู้สูบบุหรี่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งร้อยละ 34.2 กลุ่มผู้ไม่สูบบุหรี่
 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งถึงร้อยละ 65.8 แต่ความเห็นเรื่องการสูบบุหรี่ช่วยผ่อนคลายความ
 ตึงเครียดของจิตใจนั้น กลุ่มผู้สูบบุหรี่มีความเห็นด้วยอย่างยิ่งร้อยละ 25.3 ในขณะที่กลุ่มผู้
 ไม่สูบบุหรี่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งร้อยละ 57.7 การสูบบุหรี่ในที่สาธารณะเป็นสิทธิส่วนบุคคล
 กลุ่มผู้สูบบุหรี่ตอบไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งร้อยละ 35.6 ส่วนกลุ่มผู้ไม่สูบบุหรี่ตอบไม่เห็นด้วย
 ร้อยละ 67.0 การสูบบุหรี่ทำให้เข้าสังคมได้ง่าย กลุ่มผู้สูบบุหรี่มีความเห็นที่ไม่เห็นด้วย
 อย่างยิ่งร้อยละ 38.5 ส่วนกลุ่มผู้ไม่สูบบุหรี่มีความเห็นที่ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งถึงร้อยละ
 71.4 เมื่อถามถึงโทษของการสูบบุหรี่ว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพ, ทำให้เกิดภาวะน่า
 รำคาญที่อยู่ใกล้, การได้รับควันบุหรี่บ่อยๆ อาจทำให้คนข้างเคียงเกิดโรคหลอดลมอักเสบ
 เรื้อรังหรือมะเร็งได้ และคนสูบบุหรี่จะมีกลิ่นตัว เป็นที่น่ารังเกียจ ส่วนใหญ่พบว่าทั้งกลุ่ม
 ผู้สูบบุหรี่และกลุ่มไม่สูบบุหรี่ตอบ เห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยกลุ่มผู้สูบบุหรี่เห็นด้วยกับทัศนคติดังกล่าว
 ถึงร้อยละ 43.8, 37.7, 36.4 และ 26.6 ตามลำดับ ส่วนกลุ่มผู้ไม่สูบบุหรี่เห็น
 ด้วยอย่างยิ่งร้อยละ 77.8, 75.2, 63.7 และ 52.7 ตามลำดับ

ศูนย์วิทยทรัพยากร
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 3.6 แสดงคะแนนเฉลี่ยของความรู้เกี่ยวกับบุหรีมีส่วน เกี่ยวข้องหรือ เป็นสาเหตุสำคัญของโรค จำแนกตามผู้สูบและไม่สูบบุหรี

บุหรีเป็น สาเหตุสำคัญของโรค	สูบ			ไม่สูบ			t-Value	p-Value
	MEAN	S.D.	จำนวน	MEAN	S.D.	จำนวน		
1. โรคหลอดลมอักเสบ เรื้อรัง	2.95	1.26	532	3.44	.86	3022	-8.49	.000**
2. โรคถุงลมโป่งพอง	3.04	1.24	538	3.48	.86	3041	-8.11	.000**
3. โรคมะเร็งปอด	3.17	1.17	539	3.66	.71	3046	-9.32	.000**
4. โรคเส้นเลือดหัวใจตีบตัน	2.68	1.32	537	3.14	1.09	3032	-7.46	.000**
คะแนนรวม	11.87	4.44	530	13.73	2.96	3009	-9.27	.000**

** มีนัยสำคัญทางสถิติอย่างสูง (P < .01)

ตารางที่ 3.6 เมื่อคิดคะแนนเฉลี่ยของความรู้ในด้านบุหรีเป็นสาเหตุสำคัญของโรคทั้ง 4 โรค ซึ่งได้แก่ โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง โรคถุงลมโป่งพอง โรคมะเร็งปอด โรคเส้นเลือดหัวใจตีบตัน จะพบว่ากลุ่มนิสิตที่ไม่สูบบุหรีมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มนิสิตที่สูบบุหรี ในทุกโรครดังกล่าวข้างต้น และเมื่อทดสอบโดยใช้ t-test แล้ว พบว่ามีนัยสำคัญทางสถิติอย่างสูง (P < .01) และจากผลรวมของคะแนนความรู้ พบว่ากลุ่มที่ไม่สูบบุหรี มีความรู้มากกว่ากลุ่มที่สูบบุหรี (ด้วยคะแนนเฉลี่ย 13.73, 11.87 ตามลำดับ) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ตารางที่ 3.7 แสดงคะแนนเฉลี่ยของทัศนคติในด้านความคิดเห็นที่มีต่อบุหรี่
ในด้านบวก และลบ จำแนกตามผู้สูบและไม่สูบบุหรี่

ทัศนคติ	สูบ			ไม่สูบ			t-Value	p-Value
	MEAN	S.D.	จำนวน	MEAN	S.D.	จำนวน		
1. การสูบบุหรี่เพียงเล็กน้อยไม่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	2.64	1.45	541	1.74	1.18	3051	13.68	.000**
2. การสูบบุหรี่ช่วยผ่อนคลาย ความตึงเครียดของจิตใจ	3.34	1.36	541	1.87	1.20	3050	23.39	.000**
3. การสูบบุหรี่ที่สาธารณะ เป็นสิทธิส่วนบุคคล	2.58	1.49	540	1.73	1.22	3048	12.43	.000**
4. การสูบบุหรี่ทำให้เข้าสังคม ได้ง่าย	2.27	1.28	535	1.52	.96	3037	12.88	.000**
5. บุหรี่มีสารให้โทษต่อร่างกาย การสูบบุหรี่จึงเป็นอันตรายต่อ สุขภาพ และไม่ควรรสูบ	3.70	1.42	541	4.48	1.16	3054	-12.10	.000**
6. เป็นภวระน่ารำคาญที่อยู่ใกล้ คนกำลังสูบบุหรี่	3.56	1.44	541	4.45	1.12	3047	-13.70	.000**
7. การได้รับควันบุหรี่บ่อยๆ อาจ ทำให้คนข้างเคียงเกิดโรคหลอดลม อักเสบ เรื้อรังหรือมะเร็งปอดได้	3.62	1.36	541	4.33	1.10	3054	-11.37	.000**
8. คนสูบบุหรี่จะมีกลิ่นติดตัว เป็นที่น่ารังเกียจ	3.15	1.48	541	4.00	1.28	3051	-12.54	.000**
รวมคะแนน	27.20	6.42	534	34.40	5.34	3018	-24.44	.000**

** มีนัยสำคัญทางสถิติอย่างสูง (P < .01)

จากตารางที่ 3.7 พบว่า ทักษะคิดในทางลบอันได้แก่ 1. การสูบบุหรี่เพียงเล็กน้อยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 2. การสูบบุหรี่ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดของจิตใจ 3. การสูบบุหรี่ที่สาธารณะเป็นสิทธิส่วนบุคคล 4. การสูบบุหรี่ทำให้เข้าสังคมได้ง่าย ปรากฏว่า กลุ่มนิสิตที่สูบบุหรี่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มผู้ไม่สูบบุหรี่ทุกข้อคำถาม และอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < .01$) ซึ่งแสดงถึงว่า นิสิตกลุ่มที่สูบบุหรี่มีทัศนคติว่าการสูบบุหรี่ดี และในทางตรงกันข้ามทัศนคติในทางบวกได้แก่ 5. บุหรี่มีสารให้โทษต่อร่างกายการสูบบุหรี่จึงเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และไม่ควรรสูบ 6. เป็นภวาระน่ารำคาญที่อยู่ใกล้คนกำลังสูบบุหรี่ 7. การได้รับควันบุหรี่บ่อย ๆ ทำให้คนข้างเคียงเกิดโรคหลอดลมอักเสบ เรื้อรังหรือมะเร็งปอดได้ 8. คนสูบบุหรี่จะมีกลิ่นติดตัวเป็นที่น่ารังเกียจ ปรากฏว่ากลุ่มที่ไม่สูบบุหรี่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มที่สูบบุหรี่ทุกข้อคำถามอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < .01$) ซึ่งแสดงถึงว่านิสิตที่ไม่สูบบุหรี่มีทัศนคติต่อการสูบบุหรี่ไม่ดี จากผลรวมของคะแนนทัศนคติพบว่ากลุ่มที่ไม่สูบบุหรี่มีทัศนคติสูงกว่ากลุ่มสูบบุหรี่ด้วยคะแนน 34.40, และ 27.20 ตามลำดับอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < .01$) แสดงถึงว่าผู้ไม่สูบบุหรี่จะมีทัศนคติที่ถูกต้องมากกว่ากลุ่มสูบบุหรี่

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 3.8 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับการสูบบุหรี่ของนิสิต

ตัวแปร	จำนวน	df.	X ²	p-Value
1. สถานภาพสมรสของ				
บิดามารดา	3592	2	3.88	.1437
2. สถานศึกษาที่นิสิตจบ	3598	1	0.73	.3924
3. ภูมิภาคเนาบิดามารดา				
ปัจจุบัน	3586	1	1.76	.1848
4. ผู้ที่นิสิตอาศัยอยู่ด้วย	3593	3	9.08	.0281*
5. ผู้ที่ให้ค่าใช้จ่ายแก่นิสิต	3589	2	8.95	.0114*
6. ค่าใช้จ่ายแต่ละเดือน	3529	2	67.56	.0000**
7. เงินที่ได้รับ เพียงพอกับ				
ค่าใช้จ่าย	3588	1	58.91	.0000**
8. การเดินทางมามหา				
วิทยาลัย	3576	2	32.92	.0000**

* นัยสำคัญทางสถิติ (P < .05)

** นัยสำคัญทางสถิติอย่างสูง (P < .01)

เมื่อทำการศึกษาถึงความสัมพันธ์ ปัจจัยบางประการกับการสูบบุหรี่ ดังแสดงในตารางที่ 3.8 พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสูบบุหรี่อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ ผู้ที่นิสิตอาศัยอยู่ด้วย ผู้ที่ให้ค่าใช้จ่ายแก่นิสิต เงินค่าใช้จ่ายแต่ละเดือน เงินค่าใช้จ่ายที่ได้รับเพียงพอกับค่าใช้จ่าย และการเดินทางมาหาวิทยาลัย

เมื่อทำการหาค่าเฉลี่ยและส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความรู้เกี่ยวกับว่า บุหรี่เป็นสาเหตุของโรคต่างๆ ตามกลุ่มคณะที่แบ่งใหม่แสดงในตารางที่ 3.9 คณะต่าง ๆ ที่ศึกษา 15 คณะ ออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ โดยอาศัยวิชาที่สอบเข้าแต่ละคณะ เป็นเกณฑ์ในการ แบ่ง ดังต่อไปนี้

1. กลุ่มวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้แก่ คณะทันตแพทยศาสตร์, แพทยศาสตร์, เกษศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และสัตวแพทยศาสตร์
2. กลุ่มศิลป์ ซึ่งได้แก่ คณะครุศาสตร์, นิติศาสตร์, นิเทศศาสตร์, รัฐศาสตร์, ศิลปกรรมศาสตร์, และอักษรศาสตร์
3. กลุ่มวิทยาศาสตร์ และศิลป์ ซึ่งได้แก่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี, วิศวกรรมศาสตร์, เศรษฐศาสตร์, และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ตารางที่ 3.9 แสดงคะแนนค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในด้านความรู้ ว่าบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของโรคทั้ง 4 โรค จำแนกตามกลุ่มคณะ

กลุ่มคณะที่แบ่ง	MEAN	S.D.	จำนวน	F
1. กลุ่มวิทยาศาสตร์	14.10	2.78	1154	35.99**
2. กลุ่มศิลป์	13.21	3.67	676	
3. กลุ่มวิทยาศาสตร์และศิลป์	12.94	3.38	1706	
รวม	13.45	3.26	3539	

** P < .01

ปรากฏว่าความรู้ของนิสิตใน 3 กลุ่มคณะ เรื่องบุหรืมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นสาเหตุสำคัญของโรค ทั้ง 4 โรคดังกล่าว มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < .05$) กลุ่มคณะที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มอื่นคือกลุ่มวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย คณะทันตแพทยศาสตร์, แพทยศาสตร์, เกษศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และสัตวแพทยศาสตร์

ตารางที่ 3.10 แสดงคะแนน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในด้านความรู้เกี่ยวกับความรุนแรงของโรค จำแนกตามกลุ่มคณะ

กลุ่มคณะที่แบ่ง	MEAN	S.D.	จำนวน	F
1. กลุ่มวิทยาศาสตร์	3.59	.65	1160	41.33**
2. กลุ่มศิลป	3.44	.81	1724	
3. กลุ่มวิทยาศาสตร์และศิลป	3.23	1.06	685	
รวม	3.45	.82	3569	

** $P < .01$

จากตารางที่ 3.10 จะเห็นคะแนนเฉลี่ยของความรู้เกี่ยวกับความรุนแรงของโรค มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($P < .05$) ใน 3 กลุ่มคณะ กลุ่มคณะที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่ากลุ่มอื่นคือกลุ่มวิทยาศาสตร์ เช่นกัน

ตารางที่ 3.11 แสดงคะแนนค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านทัศนคติ
จำแนกตามกลุ่มคณะ

กลุ่มคณะที่แบ่ง	MEAN	S.D.	จำนวน	F
1. กลุ่มวิทยาศาสตร์	35.09	5.32	1145	80.35**
2. กลุ่มศิลป์	32.73	5.96	1716	
3. กลุ่มวิทยาศาสตร์และศิลป์	31.83	6.85	691	
รวม	24.25	4.80	3552	

** P < .01

เมื่อทำการจำแนกคะแนนเฉลี่ยด้านทัศนคติ โดยรวมคะแนนด้านทัศนคติ ทั้ง 8 ข้อที่เกี่ยวกับผลของบุหรี่ยิ่งในด้านบวก และลบแล้ว ผลการจำแนกดังแสดงในตารางที่ 3.11 เมื่อทำการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ย ด้านทัศนคติใน 3 กลุ่มคณะแล้ว พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างนัยสำคัญทางสถิติ ($P < .01$) กลุ่มที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือกลุ่มวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย คณะทันตแพทยศาสตร์, แพทยศาสตร์, เภสัชศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และสัตวแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมวดที่ 4

ข้อมูล เกี่ยวกับผู้สูบบุหรี่

เฉพาะผู้สูบบุหรี่ จากการสัมภาษณ์ผู้สูบบุหรี่ จำนวน 542 คน
ได้ผลดังแสดงในตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 แสดงลักษณะของผู้สูบบุหรี่จำแนกตามปัจจัยต่าง ๆ

ตัวแปร	จำนวน	ร้อยละ
1. ลักษณะของการสูบ		
- สูบทุกวัน	210	39.3
- สูบบ่อยแต่ไม่ทุกวัน	109	20.4
- สูบนานาครั้ง	216	40.3
รวม	535	100.0
2. จำนวนบุหรี่ที่สูบต่อวัน		
- < 10 มวน	350	64.6
- 11 - 20 มวน	81	14.9
- > 20 มวน	111	20.5
รวม	542	100.0
3. ลักษณะของการซื้อสูบ		
- ซื้อสูบเอง	419	78.3
- ไม่ซื้อสูบเอง	113	21.1
- ทั้งสองอย่าง	3	.6
รวม	535	100.0

ตารางที่ 4.1 (ต่อ) แสดงลักษณะของผู้สูบบุหรี่จำแนกตามปัจจัยต่าง ๆ

ตัวแปร	จำนวน	ร้อยละ
4. ชนิดของบุหรี่		
- ผลิตจากต่างประเทศ	287	54.4
- ผลิตภายในประเทศ	175	33.1
- ทั้งในและนอกประเทศ	66	12.5
รวม	528	100.0
5. ระดับการศึกษาที่สูบ		
- เรียนชั้นประถม	27	5.1
- มัธยมศึกษา	76	14.2
- มัธยมศึกษาปลาย	206	38.6
- อุดมศึกษา	225	42.1
รวม	534	100.0
6. มีบุคคลในครอบครัวสูบบุหรี่		
- มี	298	55.6
- ไม่มี	238	44.4
รวม	536	100.0
7. จำนวนคนในครอบครัวที่มีผู้สูบบุหรี่ (เพศชาย)		
- จำนวน 1 คน	166	60.6
- จำนวน 2 คน	54	19.7
- จำนวน > 3 คน	54	19.7
รวม	274	100.0
8. จำนวนคนในครอบครัวที่มีผู้สูบบุหรี่ (เพศหญิง)		
- จำนวน 1 คน	17	85.0
- จำนวน 2 คน	3	15.0
รวม	20	100.0

ตารางที่ 4.1 พบว่าผู้สูบบุหรี่มีลักษณะการสูบบุหรี่ทุกวันร้อยละ 39.3 สูบบ้างแต่ไม่ทุกวันร้อยละ 20.4 และสูบนานครั้งร้อยละ 40.3 ส่วนจำนวนบุหรี่ที่สูบต่อวันพบว่า น้อยกว่า 10 มวนมีร้อยละ 64.6 ระหว่าง 11-20 มวน มีร้อยละ 14.9 มากกว่า 21 มวนมีร้อยละ 20.5 ลักษณะของการซื้อบุหรี่สูบพบว่า ซื้อสูบเองมีร้อยละ 78.3 ไม่ซื้อสูบเองร้อยละ 21.1 และมีพวกที่ซื้อสูบเองบ้างไม่ซื้อเองบ้างเพียงร้อยละ 0.6 ชนิดของบุหรี่ที่นิยตสูบบุหรี่ จะซื้อบุหรี่ที่ผลิตจากต่างประเทศร้อยละ 54.4 บุหรี่ที่ผลิตภายในประเทศร้อยละ 33.1 ระดับการศึกษาที่นิยตเริ่มสูบบุหรี่ว่า เริ่มสูบ เมื่อเรียนในระดับประถมร้อยละ 5.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีร้อยละ 14.2 มัธยมศึกษาตอนปลายมีร้อยละ 38.6 และระดับอุดมศึกษามีถึงร้อยละ 42.1 ผู้ที่สูบบุหรี่จะมีบุคคลในครอบครัวสูบบุหรี่ถึงร้อยละ 55.6 และไม่มีผู้สูบบุหรี่ร้อยละ 44.4 ในบรรดาบุคคลที่สูบบุหรี่ในครอบครัวพบว่า จะเป็นชายจำนวน 1 คน ร้อยละ 60.6 จำนวนชาย 2 คน มีร้อยละ 19.7 และจำนวนชายที่สูบบุหรี่ในครอบครัวมากกว่า 3 คนมีร้อยละ 19.7 และบุคคลที่ในครอบครัวสูบบุหรี่เป็นหญิงจำนวน 1 คนมีร้อยละ 85 และ 2 คน มีร้อยละ 15

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางที่ 4.2 แสดงจำนวนและร้อยละของนิสิตที่สูบบุหรี่จำแนกตาม เหตุผลการสูบบุหรี่ ภายในประเทศ

สาเหตุสูบบุหรี่ภายในประเทศ	จำนวน	ร้อยละ
หาซื้อง่าย	143	26.7
ราคาถูก	110	20.5
รสนิยมถูกปาก	46	8.6
หาบุหรี่นอกไม่ได้	41	7.7
สูบตามเพื่อน	26	4.9
ชาตินิยม	24	4.5
ได้ฟรี	6	1.1
ตอบมากกว่า 1 ข้อ	140	26.1
รวม	536	100.0

ตารางที่ 4.2 พบว่าเหตุผลที่นิสิตสูบบุหรี่ภายในประเทศ คือหาซื้อง่ายมีร้อยละ 26.7 ราคาถูกมีร้อยละ 20.5 และมีที่ตอบต่ำกว่าร้อยละ 10 ได้แก่ รสนิยมถูกปาก หาบุหรี่นอกไม่ได้ สูบตามเพื่อน ชาตินิยม ได้ฟรีมีร้อยละ 8.6, 7.7, 4.9, 4.5, และ 1.1 ตามลำดับ และมีตอบหลายคำตอบในข้อเดียวกัน คือตอบมากกว่า 1 ข้อ มีร้อยละ 26.1

ตารางที่ 4.3 แสดงจำนวนและร้อยละของนิสิตที่สูบบุหรี่ต่างประเทศ จำแนกตามเหตุผลที่ทำให้เลือกสูบบุหรี่ที่ผลิตจากต่างประเทศ

สาเหตุสูบบุหรี่ต่างประเทศ	จำนวน	ร้อยละ
รสชาติดีกว่า	138	25.7
เชื่อว่าปลอดภัยกว่า	137	25.5
ได้ฟรี	80	14.9
โก้เก๋กว่า	76	14.2
รสมันนุ่มกว่า	17	3.2
เชื่อโฆษณา	8	1.5
รสนิยมถูกปาก	7	1.3
อร่อยกว่า	1	0.2
ไม่ตอบ	73	13.6
รวม	537	100.0

ตารางที่ 4.3 พบว่าผู้ที่สูบบุหรี่ที่ผลิตจากต่างประเทศมีเหตุผล คือรสชาติถูกปากร้อยละ 25.7 เชื่อว่าปลอดภัยกว่าร้อยละ 25.5 ได้ฟรีร้อยละ 14.9 โก้เก๋กว่าร้อยละ 14.2 และเหตุผลอื่นอีก เช่น รสมันนุ่มกว่า เชื่อโฆษณา รสนิยมถูกปาก อร่อยกว่าอีก ร้อยละ 3.2, 1.5, 1.3 และ 0.2 ตามลำดับ

ตารางที่ 4.4 แสดงจำนวนและร้อยละของเหตุผลในการเริ่มสูบบุหรี่ของนิสิตตามลำดับ

สาเหตุสำคัญที่สูบบุหรี่	จำนวน	ร้อยละ
ต้องการทดลองหรือเรียนรู้	172	33.0
เพื่อดับทุกข์/ความกลัดกลุ้มใจ	90	17.3
นอนดึกต้องการดูหนังสือ	65	12.5
เพื่อช่วยในการเข้าสังคม	54	10.4
เพื่อนชักชวนให้สูบบุหรี่	42	8.1
ทำให้ดูทันสมัย โกะโก้	16	3.1
ทำให้รู้สึกเป็นผู้ใหญ่ขึ้น	15	2.9
ปัญหาเพื่อนต่างเพศ	14	2.7
ถูกรุ่นพี่บังคับ	7	1.3
เลียนแบบบุคคลที่นิสิตชื่นชอบ	5	1.0
คู่มือมาแล้วอยากสูบ	5	1.0
เลียนแบบผู้ปกครอง	2	.4
ตอบมากกว่า 1 ข้อ	34	6.5
รวม	521	100.0

ตารางที่ 4.4 เหตุผลที่สำคัญที่สุดที่นิสิตเริ่มสูบบุหรี่ ได้แก่ ต้องการทดลองหรือเรียนรู้ ร้อยละ 33.0 เหตุผลอื่นได้แก่ เพื่อดับทุกข์/ความกลัด กลุ้มใจร้อยละ 17.3 นอนดึกต้องการดูหนังสือ 12.5 เพื่อช่วยในการเข้าสังคม ร้อยละ 10.4 นอกจากนี้ ได้แก่ เพื่อนชักชวนให้สูบ, ทำให้ดูทันสมัย โกะโก้, ทำให้รู้สึกเป็นผู้ใหญ่ขึ้น, ปัญหาเพื่อนต่างเพศ, ถูกรุ่นพี่บังคับ, เลียนแบบบุคคลที่นิสิตชื่นชอบ คู่มือมาแล้วอยากสูบ, เลียนแบบผู้ปกครอง อีกร้อยละ 8.1, 3.1, 2.9, 2.7, 1.3, 1.0, 1.0, 0.4 ตามลำดับ และมีผู้ตอบมากกว่า 1 ข้อคือตอบหลายข้อในคำถามเดียวกันนี้อีก ร้อยละ 6.5

ตารางที่ 4.5 แสดงจำนวนและร้อยละของนิสิตที่ปัจจุบันสูบบุหรี่ จำแนกตามความตั้งใจ
เกี่ยวกับการสูบบุหรี่

อนาคตการสูบบุหรี่	จำนวน	ร้อยละ
ไม่เลิกสูบบุหรี่	47	8.8
จะสูบลดลง	82	15.3
อาจจะเลิกสูบบุหรี่	159	29.7
เลิกสูบบุหรี่แน่นอน	184	34.3
ไม่แน่ใจ	64	11.9
รวม	536	100.0

ตารางที่ 4.5 นิสิตที่สูบบุหรี่มีความตั้งใจเรื่องของอนาคตเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ว่าจะไม่เลิกสูบบุหรี่ร้อยละ 8.8 จะสูบลดลงร้อยละ 15.3 อาจจะเลิกสูบบุหรี่ร้อยละ 29.7 เลิกสูบบุหรี่แน่นอนร้อยละ 34.3 ไม่แน่ใจร้อยละ 11.9

ตารางที่ 4.6 แสดงจำนวนและร้อยละของนิสิตที่ปัจจุบันสูบบุหรี่ จำแนกตามอดีตเคยเลิก
และไม่เคยสูบบุหรี่

ปัจจุบันสูบบุหรี่	จำนวน	ร้อยละ
เคยเลิกสูบบุหรี่	321	60.2
ไม่เคยเลิกสูบบุหรี่	212	39.8
รวม	533	100.0

ตารางที่ 4.6 พบว่านิสิตที่สูบบุหรี่เคยเลิกสูบบุหรี่ร้อยละ 60.2 ไม่เคยเลิก ร้อยละ 39.8

ตารางที่ 4.7 แสดงจำนวนและร้อยละของนิสิตที่สูบบุหรี่จำแนกตาม เหตุผลสำคัญที่สุดที่ นิสิตกลับมาสูบบุหรี่

เหตุที่กลับมาสูบบุหรี่	จำนวน	ร้อยละ
เพื่อดับทุกข์/ความกลัดกลุ้มใจ	87	27.7
หงุดหงิด เมื่อไม่ได้สูบบุหรี่	84	26.8
นอนติดต้องการดูหนังสือ	43	13.7
เพื่อช่วยในการเข้าสังคม	41	13.1
เพื่อนชักชวนให้สูบบุหรี่ใหม่	22	7.0
คู่มือฆาตกรแล้วทำให้อยากสูบ	20	6.4
ทำให้คุ้มสมัย	12	3.8
ถูกรุ่นพี่บังคับ	3	1.0
ทำให้รู้สึก เป็นผู้ใหญ่ขึ้น	2	.6
รวม	314	100.0

ตารางที่ 4.7 พบว่าเหตุผลสำคัญสองอันดับแรกที่นิสิตเคยเลิกสูบบุหรี่แล้วกลับมา สูบบุหรี่อีก ได้แก่ เพื่อดับทุกข์/ความกลัดกลุ้มใจและหงุดหงิด เมื่อไม่ได้สูบบุหรี่ร้อยละ 27.7, 26.8 ตามลำดับ นอนติดต้องการดูหนังสืออีกร้อยละ 13.7 เพื่อช่วยในการเข้าสังคม ร้อยละ 13.1 เป็นต้น

ตารางที่ 4.8 แสดงจำนวนและร้อยละของนิสิตที่ไม่เคยเลิกสูบบุหรี่ จำแนกตามเหตุผล
ที่นิสิตไม่คิดจะเลิกสูบบุหรี่

เหตุที่ไม่คิดจะเลิกสูบบุหรี่	จำนวน	ร้อยละ
ช่วยดับทุกข์/ความกลัดกลุ้มใจ	29	15.4
ว่างไม่มีอะไรทำ	29	15.4
นอนดีต้องการดูหนังสือ	23	12.2
ช่วยในการเข้าสังคมได้ดี	21	11.2
เชื่อว่าตนเองคงไม่เกิดโรค	21	11.2
หงุดหงิดเมื่อไม่ได้สูบบุหรี่	17	9.0
เพื่อนใกล้ชิดยังสูบบุหรี่	13	6.9
ทำให้ดูทันสมัย โกะเก๋	9	4.8
ไม่เชื่อว่าบุหรี่เป็นอันตราย	6	3.2
ช่วยแก้เขิน	5	2.7
ทำให้รู้สึกเป็นผู้ใหญ่ขึ้น	3	1.6
ไม่รู้จะเลิกสูบบุหรี่ทำไม	2	1.1
ตอบมากกว่า 1 ข้อ	10	5.3
รวม	188	100.0

ตารางที่ 4.8 พบว่านิสิตที่ไม่เลิกสูบบุหรี่ เหตุผลสำคัญที่ทำให้ไม่คิดเลิกสูบบุหรี่จากมากไปหาน้อย ดังนี้คือ ช่วยดับทุกข์/ความกลัดกลุ้มใจ และ ว่างไม่มีอะไรทำร้อยละ 15.4 เท่ากันและนอนดีต้องการดูหนังสือน้อยละ 12.2 เป็นลำดับรองลงมา ช่วยในการเข้าสังคมได้ดี และเชื่อว่าตนเองคงไม่เกิดโรคร้อยละ 11.2 นอกจากนี้ยังมีเหตุผลอื่นอีก เช่น หงุดหงิดเมื่อไม่ได้สูบบุหรี่ เพื่อนใกล้ชิดยังสูบบุหรี่ ทำให้ดูทันสมัย โกะเก๋ ไม่เชื่อว่าบุหรี่เป็นอันตราย ช่วยแก้เขิน ทำให้รู้สึกเป็นผู้ใหญ่ขึ้น ไม่รู้จะเลิกทำไมอีกร้อยละ 9.0, 6.9, 4.8, 3.2, 2.7, 1.6, 1.1 ตามลำดับ และมีผู้ตอบมากกว่า 1 ข้อ ในคำตอบเดียวนี้อีกร้อยละ 5.3

หมวดที่ 5

ข้อมูล เกี่ยวกับผู้ไม่สูบบุหรี่

เฉพาะผู้ไม่สูบบุหรี่ จากการสัมภาษณ์ผู้ไม่สูบบุหรี่ จำนวน 3,046 คน จะได้ผล
ดังแสดงในตารางที่

ตารางที่ 5.1 แสดงลักษณะของผู้ไม่สูบบุหรี่ แต่เคยสูบบุหรี่จำแนกตามปัจจัยต่างๆ

ตัวแปร	ความถี่	ร้อยละ
การสูบบุหรี่ในอดีต		
- เคย	322	10.6
- ไม่เคย	2724	89.4
รวม	3046	100.0
ระยะเวลาที่เคยเลิก		
- < 1 ปี	58	37.9
- 1 - 2 ปี	73	47.7
- 3 ปี >	22	14.4
รวม	153	100.0
จำนวนครั้งที่เคยเลิก		
1 ครั้ง	93	75.6
2 ครั้ง	20	16.3
3 ครั้ง >	10	8.1
รวม	123	100.0
ความคิดเกี่ยวกับการสูบบุหรี่		
- อาจจะสู่อีก	86	33.2
- เลิกแน่	173	66.8
รวม	259	100.0

ตารางที่ 5.1 จากการสำรวจผู้ไม่สูบบุหรี่จำนวน 3046 คน จะเห็นว่าเคยสูบบุหรี่ในอดีตร้อยละ 10.6 เมื่อสอบถามถึงระยะเวลาส่วนใหญ่เลิกช่วง 1 - 2 ปี ร้อยละ 47.7 และส่วนใหญ่จะเคยเลิกจำนวน 1 ครั้ง ร้อยละ 75.6 ส่วนความคิดเกี่ยวกับการสูบบุหรี่คิดว่าเลิกแน่ ร้อยละ 66.8

ตารางที่ 5.2 แสดงจำนวนและร้อยละของนิสิตที่ปัจจุบันไม่สูบบุหรี่แต่เคยสูบบุหรี่ จำแนกตามเหตุผลสำคัญที่สุดที่เลิกสูบบุหรี่

เหตุผลสำคัญที่เลิก	จำนวน	ร้อยละ
กลัวอันตราย	94	30.1
สิ้นเปลือง	34	10.8
สุขภาพไม่เอื้ออำนวย	27	8.7
ไม่ชอบกลิ่นและรสของบุหรี่	19	6.1
แฟนไม่ชอบ	18	5.8
อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ยอม รับการสูบบุหรี่	12	3.8
เท็ม เสื้อผ้า	5	1.6
เกรงใจเพื่อนสนิท	3	1.0
ไม่มีเหตุผลเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง (แต่ไม่เคยนึกอยาก)	100	32.1
รวม	312	100.0

ตารางที่ 5.2 พบว่านิสิตที่เคยสูบบุหรี่มีเหตุผลสำคัญที่ไม่สูบบุหรี่มีร้อยละ 32.2 ไม่มีเหตุผลเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง(แต่ไม่เคยนึกอยาก) และมีร้อยละ 30.1 กลัวอันตราย รองลงมาคือสิ้นเปลือง 10.8

ตารางที่ 5.3 แสดงจำนวนและร้อยละของนิสิตที่ไม่สูบบุหรี่และไม่เคยสูบบุหรี่ จำแนกตาม เหตุผลสำคัญที่สุดที่ไม่สูบบุหรี่

เหตุผลสำคัญที่ไม่สูบบุหรี่	จำนวน	ร้อยละ
ไม่เคยนึกอยากและไม่ เคยนึกอยาก ลอง	1000	37.0
กลัวอันตราย	723	26.7
ไม่ชอบกลิ่นและรสของบุหรี่	230	8.5
เคยลองแต่ไม่ชอบ โดยไม่มีเหตุผล เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง	224	8.3
เหมือนกลิ่นบุหรี่	193	7.1
สิ้น เปลือง	119	4.4
อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ยอมรับการสูบบุหรี่	40	1.5
สุขภาพไม่ เอื้ออำนวย	34	1.3
กลัวบิดา มารดา	25	.9
กลัวฟันเหลือง นิ้วเหลือง ปากดำ	10	.4
กลัวว่าจะ เป็นที่รังเกียจของสังคม	11	.4
กลัวครู	5	.2
ตอบมากกว่า 1 ข้อ	90	3.3
รวม	2704	100.0

ตารางที่ 5.3 พบว่านิสิตที่ไม่สูบบุหรี่มีเหตุผลสำคัญที่ไม่สูบบุหรี่คือ ไม่มีเหตุผลเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง (แต่ไม่เคยนึกอยากและไม่เคยนึกอยากลอง) ร้อยละ 37.0 รองลงมาคือกลัวอันตราย มีร้อยละ 26.7