

บทที่ 4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเรื่อง ตัวชี้วัดคุณภาพด้านผลลัพธ์การพยาบาลสำหรับผู้ป่วยกลุ่มอาการหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน โดยใช้การวิจัยเทคนิคในลักษณะเคสฟาย ในการศึกษา รายการตัวชี้วัดคุณภาพด้านผลลัพธ์การพยาบาลสำหรับผู้ป่วยกลุ่มอาการหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน จากความคิดเห็นของผู้มีประสบการณ์ในงานวิจัย และความเป็นไปได้ในการนำตัวชี้วัดคุณภาพด้านผลลัพธ์การพยาบาล สำหรับผู้ป่วยกลุ่มอาการหลอดเลือดสมองเฉียบพลันไปใช้ในการประเมินคุณภาพ ที่ประเมินโดยกลุ่มผู้มีประสบการณ์

ผลการศึกษานี้ได้ตัวชี้วัดคุณภาพด้านผลลัพธ์การพยาบาลสำหรับผู้ป่วยกลุ่มอาการหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน จำนวน 60 รายการ ซึ่งจำแนกได้ 6 กลุ่ม ดังนี้

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. กลุ่มสุขภาพการทำหน้าที่ของร่างกาย | จำนวน 3 รายการ |
| 2. กลุ่มสุขภาพสรีรวิทยา | จำนวน 28 รายการ |
| 3. กลุ่มสุขภาพด้านจิตสังคม | จำนวน 9 รายการ |
| 4. กลุ่มความรู้และพฤติกรรมสุขภาพ | จำนวน 7 รายการ |
| 5. กลุ่มการรับรู้ภาวะสุขภาพ | จำนวน 6 รายการ |
| 6. กลุ่มสุขภาพครอบครัว/ผู้ดูแล | จำนวน 7 รายการ |

การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยนี้ นำเสนอในรูปแบบตาราง ที่แสดงถึงระดับความสำคัญ ความสอดคล้องและความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ของตัวชี้วัดคุณภาพด้านผลลัพธ์การพยาบาล สำหรับผู้ป่วยกลุ่มอาการหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน โดยรวมและรายกลุ่ม

1. ตัวชี้วัดคุณภาพด้านผลลัพธ์การพยาบาล สำหรับผู้ป่วยกลุ่มอาการหลอดเลือดสมองเฉียบพลันโดยรวม ประกอบด้วย 6 กลุ่ม แสดงถึงระดับความสำคัญและความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ (ตารางที่ 12)

ตารางที่ 12 ระดับความสำคัญและความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ของตัวชี้วัดคุณภาพด้านผลลัพธ์
การพยาบาลสำหรับผู้ป่วยกลุ่มอาการหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน

ตัวชี้วัดคุณภาพ ด้านผลลัพธ์การพยาบาล	ความสำคัญ		ระดับ ความสำคัญ	ความเป็นไปได้		ระดับความ เป็นไปได้
	Md	IR		Mean	SD	
1. กลุ่มสุขภาพครอบครัว/ผู้ดูแล	4.92	0.54	มากที่สุด	4.60	0.57	มากที่สุด
2. กลุ่มสุขภาพสตรีวิทยา	4.65	0.73	มากที่สุด	4.58	0.64	มากที่สุด
3. กลุ่มสุขภาพการทำหน้าที่ของ ร่างกาย	4.59	0.60	มากที่สุด	4.50	0.50	มากที่สุด
4. กลุ่มความรู้และพฤติกรรมสุขภาพ	4.58	0.56	มากที่สุด	4.47	0.66	มาก
5. กลุ่มการรับรู้สุขภาพ	4.44	0.84	มาก	4.34	0.74	มาก
6. กลุ่มสุขภาพจิตสังคม	4.40	0.88	มาก	4.28	0.76	มาก

จากตารางที่ 12 แสดงถึงลำดับความสำคัญของกลุ่มตัวชี้วัดด้านผลลัพธ์การพยาบาล
สำหรับผู้ป่วยกลุ่มอาการหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน ทั้ง 6 กลุ่ม พบว่า ผู้มีประสบการณ์ให้ความ
คิดเห็นในระดับความสำคัญมากที่สุด จำนวน 4 กลุ่ม เรียงตามค่ามัธยฐานสูงสุด ได้แก่ กลุ่มสุขภาพ
ครอบครัว/ผู้ดูแล กลุ่มสุขภาพสตรีวิทยา กลุ่มสุขภาพการทำหน้าที่ของร่างกาย และกลุ่มความรู้และ
พฤติกรรมสุขภาพ (4.92, 4.65, 4.59 และ 4.58 ตามลำดับ)

สำหรับคะแนนประเมินความเป็นไปได้การนำกลุ่มตัวชี้วัดด้านผลลัพธ์การพยาบาล
สำหรับผู้ป่วยกลุ่มอาการหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน ไปใช้ในการประเมินคุณภาพ พบว่า ผู้มี
ประสบการณ์ให้ความคิดเห็นความเป็นไปได้ในระดับมากขึ้นไปทุกกลุ่ม โดยกลุ่มสุขภาพ
ครอบครัว/ผู้ดูแล กลุ่มสุขภาพสตรีวิทยา และกลุ่มสุขภาพการทำหน้าที่ของร่างกาย มีคะแนนตัดสิน
ความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ในระดับมากที่สุด (คะแนนเฉลี่ย 4.60, 4.58 และ 4.50 ตามลำดับ)

จากการวิเคราะห์ข้อมูลลำดับความสำคัญของตัวชี้วัดคุณภาพด้านผลลัพธ์การพยาบาล
สำหรับผู้ป่วยกลุ่มอาการหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน และความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ มีความ
สอดคล้องกัน คือกลุ่มตัวชี้วัดด้านผลลัพธ์การพยาบาลที่มีความสำคัญ 3 ลำดับแรก ได้แก่ กลุ่ม
สุขภาพครอบครัว/ผู้ดูแล กลุ่มสุขภาพสตรีวิทยา และกลุ่มสุขภาพการทำหน้าที่ของร่างกาย มีความ
เป็นไปได้ในการนำไปใช้ระดับมากที่สุดเช่นกัน

2. ตัวชี้วัดคุณภาพด้านผลลัพธ์การพยาบาล สำหรับผู้ป่วยกลุ่มอาการหลอดเลือดสมอง
เฉียบพลันรายกลุ่ม แสดงถึงระดับความสำคัญและความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ ในแต่ละกลุ่ม
ตัวชี้วัดด้านผลลัพธ์การพยาบาล สำหรับผู้ป่วยกลุ่มอาการหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน โดย
เรียงลำดับตามค่ามัธยฐานสูงสุด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพกลุ่มสุขภาพครอบครัว/ผู้ดูแล ตัวชี้วัด

คุณภาพกลุ่มสุขภาพสตรีวิทยา ตัวชี้วัดคุณภาพกลุ่มสุขภาพการทำหน้าที่ของร่างกาย ตัวชี้วัดคุณภาพกลุ่มความรู้และพฤติกรรมสุขภาพ ตัวชี้วัดคุณภาพกลุ่มการรับรู้สุขภาพ และตัวชี้วัดคุณภาพกลุ่มสุขภาพจิตสังคม

2.1 ตัวชี้วัดคุณภาพกลุ่มสุขภาพครอบครัว/ผู้ดูแล ประกอบด้วยรายการตัวชี้วัดด้านผลลัพธ์การพยาบาล จำนวน 7 รายการ (ตารางที่ 13)

ตารางที่ 13 ระดับความสำคัญและความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ของตัวชี้วัดคุณภาพกลุ่มสุขภาพครอบครัว/ผู้ดูแล

ตัวชี้วัดกลุ่มสุขภาพ ครอบครัว/ผู้ดูแล	ความสำคัญ		ระดับ	ความเป็นไปได้		ระดับความ เป็นไปได้
	Md	IR	ความสำคัญ	Mean	SD	
1. สัมพันธภาพระหว่างผู้ดูแลกับผู้ป่วย	5.00	-	มากที่สุด	4.60	0.75	มากที่สุด
2. ครอบครัว/ผู้ดูแลสามารถให้การดูแลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม	5.00	-	มากที่สุด	4.73	0.44	มากที่สุด
3. ครอบครัวมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลผู้ป่วย	5.00	-	มากที่สุด	4.60	0.68	มากที่สุด
4. การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วย	4.97	0.33	มากที่สุด	4.73	0.44	มากที่สุด
5. การรับรู้ของครอบครัวต่อพยาธิสภาพของโรคและการรักษาพยาบาล	4.94	0.28	มากที่สุด	4.60	0.48	มากที่สุด
6. การปรับตัวของครอบครัว/ผู้ดูแลต่อสถานะของผู้ป่วย	4.83	0.50	มากที่สุด	4.50	0.60	มากที่สุด
7. ความเครียดของผู้ดูแล	4.70	1.08	มากที่สุด	4.50	0.60	มากที่สุด

จากตารางที่ 13 กลุ่มสุขภาพครอบครัว/ผู้ดูแลสำหรับผู้ป่วยกลุ่มอาการหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน ประกอบด้วยรายการผลลัพธ์การพยาบาล จำนวน 8 รายการ และประสพการณ์ มีความคิดเห็นสอดคล้องกันในระดับความสำคัญมากที่สุดทุกรายการ และรายการที่มีค่ามัธยฐานเท่ากับ 5 ซึ่งเป็นค่าสูงสุด จำนวน 3 รายการ ได้แก่ สัมพันธภาพระหว่างผู้ดูแลกับผู้ป่วยครอบครัว/ผู้ดูแล

สามารถให้การดูแลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม และครอบครัวมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลผู้ป่วยแสดงถึงความคิดเห็นของผู้มีประสบการณ์ทุกท่าน ให้คะแนนในระดับสำคัญมากที่สุด

ความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ของตัวชี้วัดคุณภาพด้านผลลัพธ์การพยาบาล กลุ่มสุขภาพครอบครัว/ผู้ดูแล โดยผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ประเมิน จำนวนทั้งหมด 7 รายการ มีคะแนนเฉลี่ยความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ระดับมากที่สุดทุกรายการ โดยคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 2 รายการ ได้แก่ การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย, ครอบครัว/ผู้ดูแลสามารถให้การดูแลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม (คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.73)

ความสำคัญของตัวชี้วัดคุณภาพด้านผลลัพธ์การพยาบาลและความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ของตัวชี้วัดคุณภาพกลุ่มสุขภาพครอบครัว/ผู้ดูแล มีความสอดคล้องกันในระดับมากที่สุดทุกรายการ

2.2 ตัวชี้วัดคุณภาพกลุ่มสตรีวิทยา ประกอบด้วยรายการตัวชี้วัดคุณภาพด้านผลลัพธ์การพยาบาล จำนวน 28 รายการ (ตารางที่ 14)

ตารางที่ 14 ระดับความสำคัญและความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ของตัวชี้วัดคุณภาพกลุ่มสุขภาพสตรีวิทยา

ตัวชี้วัดกลุ่มสุขภาพสตรีวิทยา	ความสำคัญ		ระดับความสำคัญ	ความเป็นไปได้		ระดับความเป็นไปได้
	Md	IR		Mean	SD	
1. สัญญาณชีพ	4.97	0.29	มากที่สุด	4.90	0.30	มากที่สุด
2. ระดับการรู้สึกตัว	4.94	0.30	มากที่สุด	4.95	0.22	มากที่สุด
3. การติดเชื้อ	4.94	0.30	มากที่สุด	4.85	0.36	มากที่สุด
4. ความดันในกะโหลกศีรษะ	4.88	0.44	มากที่สุด	4.65	0.58	มากที่สุด
5. การสื่อสาร	4.88	0.44	มากที่สุด	4.65	0.74	มากที่สุด
6. การกำซาบเนื้อเยื่อสมอง	4.83	0.50	มากที่สุด	4.50	1.00	มากที่สุด
7. ภาวะหายใจ	4.83	0.50	มากที่สุด	4.85	0.36	มากที่สุด
8. ความสมบูรณ์ของผิวหนัง และเนื้อเยื่อ	4.83	0.50	มากที่สุด	4.90	0.37	มากที่สุด
9. สุขวิทยาในช่องปาก	4.83	0.50	มากที่สุด	4.75	0.44	มากที่สุด
10. การพัดตกหมกล้ม	4.83	0.50	มากที่สุด	4.80	0.41	มากที่สุด
11. การขับถ่ายปัสสาวะ	4.83	0.50	มากที่สุด	4.80	0.41	มากที่สุด
12. การขับถ่ายอุจจาระ	4.78	0.50	มากที่สุด	4.70	0.47	มากที่สุด
13. การเกิดแผลที่กระดูกตา	4.78	0.50	มากที่สุด	4.55	0.75	มากที่สุด
14. การหย่าเครื่องช่วยหายใจ	4.68	1.00	มากที่สุด	4.50	0.68	มากที่สุด
15. ภาวะโภชนาการ	4.66	0.93	มากที่สุด	4.70	0.58	มากที่สุด
16. สมดุลของสารน้ำในร่างกาย	4.66	0.93	มากที่สุด	4.60	0.59	มากที่สุด

ตารางที่ 14 (ต่อ)

ตัวชี้วัดกลุ่มสุขภาพสตรีวิทยา	ความสำคัญ		ระดับ ความสำคัญ	ความเป็นไปได้		ระดับความ เป็นไปได้
	Md	IR		Mean	SD	
17. การรับความรู้สึกรู้สึก	4.66	0.93	มากที่สุด	4.30	0.73	มากที่สุด
18. อันตรายจากการชัก	4.60	1.09	มากที่สุด	4.10	1.51	มาก
19. ภาวะเลือดออกซ้ำ(re-bleeding)	4.60	1.09	มากที่สุด	4.00	1.55	มาก
20. การกลืน	4.59	0.95	มากที่สุด	4.60	0.59	มาก
21. สมดุลของอิเล็กโทรไลต์	4.50	1.06	มากที่สุด	4.65	0.58	มากที่สุด
22. ข้อติด กล้ามเนื้อลิ้น	4.50	1.06	มากที่สุด	4.70	0.57	มากที่สุด
23. การใช้เครื่องช่วยหายใจ	4.50	1.06	มากที่สุด	4.50	0.68	มากที่สุด
24. ระดับน้ำตาลในเลือด	4.31	0.93	มาก	4.65	0.58	มากที่สุด
25. การบาดเจ็บจากการผูกมัด	4.30	1.07	มาก	4.60	0.82	มากที่สุด
26. การเกิดลิ้มเลือดอุดตันใน หลอดเลือด	4.26	0.91	มาก	4.35	0.67	มากที่สุด
27. การแข็งตัวของเลือด	4.16	0.91	มาก	4.30	0.65	มาก
28. ความจำ	4.11	0.77	มาก	4.10	0.96	มาก

จากตารางที่ 14 จะเห็นว่ากลุ่มสุขภาพสตรีวิทยา สำหรับผู้ป่วยกลุ่มอาการหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน ประกอบด้วยรายการตัวชี้วัดด้านผลลัพธ์การพยาบาล จำนวน 28 รายการ โดยผู้มีประสบการณ์ให้ความคิดเห็นสอดคล้องกันระดับมากที่สุด จำนวน 23 รายการ และระดับมาก จำนวน 5 รายการ ตัวชี้วัดด้านผลลัพธ์การพยาบาลที่มีคะแนนสูงสุด 5 รายการแรก คือ สัญญาณชีพ (ค่ามัธยฐาน 4.94) ระดับการรู้สึกตัวและการดิ้นรน (ค่ามัธยฐาน 4.94 เท่ากัน) ความดันในกะโหลกศีรษะ และการสื่อสาร (มีค่ามัธยฐาน 4.88 เท่ากัน)

ความเป็นไปได้นำไปใช้ของตัวชี้วัดคุณภาพด้านผลลัพธ์การพยาบาล กลุ่มสุขภาพสตรีวิทยา ประเมินโดยผู้มีประสบการณ์ จำนวน 28 รายการ พบว่ามีความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ระดับมากที่สุด จำนวน 22 รายการ และระดับมาก จำนวน 6 รายการ โดยคะแนนสูงสุด 5 รายการแรก ได้แก่ ระดับการรู้สึกตัว (คะแนนเฉลี่ย 4.95) สัญญาณชีพและความสมบูรณ์ของผิวหนังและเนื้อเยื่อ (คะแนนเฉลี่ย 4.90 เท่ากัน) ภาวะการหายใจและการดิ้นรน (คะแนนเฉลี่ย 4.85 เท่ากัน)

ความสำคัญของตัวชี้วัดคุณภาพด้านผลลัพธ์การพยาบาลและความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ของตัวชี้วัดคุณภาพกลุ่มสตรีวิทยา ที่มีความสอดคล้องกันในระดับมากที่สุด มีจำนวน 20 รายการ

2.3 ตัวชี้วัดคุณภาพกลุ่มการทำหน้าที่ของร่างกาย ประกอบด้วยรายการตัวชี้วัดคุณภาพด้านผลลัพธ์การพยาบาล จำนวน 3 รายการ (ตารางที่ 15)

ตารางที่ 15 ระดับความสำคัญและความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ของตัวชี้วัดคุณภาพกลุ่มสุขภาพการทำหน้าที่ของร่างกาย

ตัวชี้วัดคุณภาพกลุ่มสุขภาพ การทำหน้าที่ของร่างกาย	ความสำคัญ		ระดับ ความสำคัญ	ความเป็นไปได้		ระดับความ เป็นไปได้
	Md	IR		Mean	SD	
1. การดูแลตนเองในกิจวัตรประจำวัน	4.94	0.34	มากที่สุด	4.85	0.49	มากที่สุด
2. การเคลื่อนไหว	4.73	0.79	มากที่สุด	4.70	0.47	มากที่สุด
3. การนอนหลับ	4.10	0.6-	มาก	4.25	0.55	มาก

จากตารางที่ 15 จะเห็นว่ากลุ่มผลลัพธ์การทำหน้าที่ของร่างกาย สำหรับผู้ป่วยกลุ่มอาการหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน ประกอบด้วยรายการผลลัพธ์การพยาบาล จำนวน 5 รายการ ผลลัพธ์ที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความคิดเห็นสอดคล้องกันในระดับมากที่สุด 3 รายการ ได้แก่ สอดคล้องในระดับมาก 2 รายการ ได้แก่ การนอนหลับ และการพักผ่อน ผลลัพธ์ที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเห็นสูงสุด คือ การดูแลตนเองในการประกอบกิจวัตรประจำวัน (มีค่ามัธยฐาน 4.94)

ความเป็นไปได้การนำไปใช้ของตัวชี้วัดคุณภาพด้านผลลัพธ์การพยาบาล กลุ่มสุขภาพการทำหน้าที่ของร่างกาย ประเมินโดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวนทั้งหมด 3 รายการ มีความเป็นไปได้ระดับมากที่สุด จำนวน 2 รายการ และระดับมาก จำนวน 1 รายการ โดยคะแนนสูงสุด ได้แก่ การดูแลตนเองในการประกอบกิจวัตรประจำวัน (คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.85)

ความสำคัญของตัวชี้วัดคุณภาพด้านผลลัพธ์การพยาบาลและความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ของตัวชี้วัดคุณภาพกลุ่มสุขภาพการทำหน้าที่ของร่างกาย มีความสอดคล้องกันในระดับมากที่สุด 2 รายการ

2.4 ตัวชี้วัดคุณภาพกลุ่มความรู้และพฤติกรรมสุขภาพ ประกอบด้วยรายการตัวชี้วัดคุณภาพด้านผลลัพธ์การพยาบาล จำนวน 7 รายการ (ตารางที่ 16)

ตารางที่ 16 ระดับความสำคัญและความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ของตัวชี้วัดกลุ่มความรู้และพฤติกรรมสุขภาพ

ตัวชี้วัดคุณภาพ กลุ่มความรู้และพฤติกรรมสุขภาพ	ความสำคัญ		ระดับ ความสำคัญ	ความเป็นไปได้		ระดับความ เป็นไปได้
	Md	IR		Mean	SD	
1. ความรู้เกี่ยวกับโรคและขั้นตอนการรักษา	4.94	0.34	มากที่สุด	4.70	0.57	มากที่สุด
2. การปฏิบัติตนเพื่อควบคุมโรคและปัจจัยเสี่ยงของการเจ็บป่วย	4.94	0.34	มากที่สุด	4.65	0.67	มากที่สุด
3. ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตน (อาหาร ยา การป้องกันอันตราย การออกกำลังกาย)	4.91	0.38	มากที่สุด	4.75	0.44	มากที่สุด
4. การป้องกันการสำลัก	4.88	0.50	มากที่สุด	4.75	0.44	มากที่สุด
5. ความรู้เกี่ยวกับแหล่งประโยชน์สนับสนุน	4.44	1.04	มาก	4.50	0.60	มาก
6. การใช้การผสมผสานทางเลือกรักษาอื่น	4.07	0.71	มาก	4.10	1.07	มาก
7. ความเชื่อด้านสุขภาพ	3.90	0.67	มาก	3.90	0.85	มาก

จากตารางที่ 16 จะเห็นว่ากลุ่มการรับรู้สุขภาพความรู้และพฤติกรรมสุขภาพ สำหรับผู้ป่วยกลุ่มอาการหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน ประกอบด้วยรายการตัวชี้วัดด้านผลลัพธ์การพยาบาล จำนวน 7 รายการ ผู้มีประสบการณ์มีความคิดเห็นสอดคล้องกันระดับมากที่สุด จำนวน 4 รายการ และระดับมาก จำนวน 3 รายการ โดยตัวชี้วัดด้านผลลัพธ์ที่มีระดับความคะแนนความสำคัญสูงสุด 2 รายการ คือ ความรู้เกี่ยวกับโรคและขั้นตอนการรักษา, การปฏิบัติตนเพื่อควบคุมโรคและปัจจัยเสี่ยงของการเจ็บป่วย (มีค่ามัธยฐาน 4.94 เท่ากัน)

ความเป็นไปได้การนำไปใช้ของตัวชี้วัดคุณภาพด้านผลลัพธ์การพยาบาล กลุ่มความรู้และพฤติกรรมสุขภาพ ประเมินโดยผู้มีประสบการณ์ จำนวนทั้งหมด 7 รายการ มีความเป็นไปได้ในระดับมากที่สุด จำนวน 5 รายการ และระดับมาก จำนวน 2 รายการ โดยคะแนนความเป็นไปได้เฉลี่ยสูงสุด 2 รายการ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตน (อาหาร ยา การป้องกันอันตราย การออกกำลังกาย) และการป้องกันการสำลัก (คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.75)

ความสำคัญของตัวชี้วัดคุณภาพด้านผลลัพธ์การพยาบาลและความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ของตัวชี้วัดคุณภาพกลุ่มความรู้และพฤติกรรมสุขภาพ มีความสอดคล้องกันในระดับมากที่สุด จำนวน 4 รายการ

2.5 ตัวชี้วัดคุณภาพกลุ่มการรับรู้สุขภาพ ประกอบด้วยรายการตัวชี้วัดคุณภาพด้านผลลัพธ์การพยาบาล จำนวน 6 รายการ (ตารางที่ 17)

ตารางที่ 17 ระดับความสำคัญและความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ของตัวชี้วัดกลุ่มการรับรู้สุขภาพ

ตัวชี้วัดคุณภาพกลุ่มการรับรู้สุขภาพ	ความสำคัญ		ระดับความสำคัญ	ความเป็นไปได้		ระดับความเป็นไปได้
	Md	IR		Mean	SD	
1. คุณภาพชีวิต	4.83	0.50	มากที่สุด	4.35	0.60	มาก
2. ความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการรักษาพยาบาล	4.78	0.67	มากที่สุด	4.55	0.60	มากที่สุด
3. การรับรู้ต่อสภาวะอาการเจ็บป่วย	4.59	1.00	มากที่สุด	4.55	0.60	มากที่สุด
4. ระดับความเจ็บปวด	4.33	0.96	มาก	4.25	0.96	มาก
5. ระดับความสุขสบาย	4.25	1.15	มาก	4.30	1.08	มาก
6. ความเชื่อทางจิตวิญญาณ(ใช้หลักทางศาสนา)	3.88	0.76	มาก	4.05	0.68	มาก

จากตารางที่ 17 จะเห็นว่าตัวชี้วัดคุณภาพกลุ่มการรับรู้สุขภาพ สำหรับผู้ป่วยกลุ่มอาการหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน ประกอบด้วยรายการตัวชี้วัดด้านผลลัพธ์การพยาบาล จำนวน 6 รายการ โดยผู้มีประสบการณ์มีความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน โดยให้ความสำคัญระดับมากที่สุด จำนวน 3 รายการ และระดับมาก จำนวน 3 รายการ ตัวชี้วัดด้านผลลัพธ์การพยาบาลที่มีคะแนนความสำคัญสูงสุด 3 รายการแรก คือ คุณภาพชีวิต (ค่ามัธยฐาน 4.83) ความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการรักษาพยาบาล (ค่ามัธยฐาน 4.78) และการรับรู้ต่อสภาวะอาการเจ็บป่วย (ค่ามัธยฐาน 4.59)

ความเป็นไปได้การนำไปใช้ของตัวชี้วัดคุณภาพด้านผลลัพธ์การพยาบาล กลุ่มการรับรู้สุขภาพ ที่ประเมินโดยผู้มีประสบการณ์ จำนวนทั้งหมด 6 รายการ มีความเป็นไปได้ในระดับมากที่สุด จำนวน 2 รายการ ได้แก่ การรับรู้ต่อสภาวะอาการเจ็บป่วย และความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการรักษาพยาบาล (คะแนนเฉลี่ย 4.55 เท่ากัน) นอกจากนั้นอยู่ในระดับมาก จำนวน 4 รายการ

ความสำคัญของตัวชี้วัดคุณภาพด้านผลลัพธ์การพยาบาลและความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ของตัวชี้วัดคุณภาพกลุ่มการรับรู้สุขภาพ มีความสอดคล้องกันในระดับมากที่สุด มีจำนวน 2 รายการ

2.5 ตัวชี้วัดคุณภาพกลุ่มการรับรู้สุขภาพจิตสังคม ประกอบด้วยรายการตัวชี้วัดคุณภาพด้านผลลัพธ์การพยาบาล จำนวน 9 รายการ (ตารางที่ 18)

ตารางที่ 18 ระดับความสำคัญและความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ของตัวชี้วัดกลุ่มสุขภาพจิตสังคม

ตัวชี้วัดคุณภาพกลุ่มสุขภาพจิตสังคม	ความสำคัญ		ระดับความสำคัญ	ความเป็นไปได้		ระดับความเป็นไปได้
	Md	IR		Mean	SD	
1. การสนับสนุนทางสังคม	4.73	0.84	มากที่สุด	4.60	0.59	มากที่สุด
2. กำลังใจและความหวังในการมีชีวิตอยู่	4.73	0.84	มากที่สุด	4.45	0.68	มาก
3. การปรับตัวและเผชิญปัญหา	4.51	0.67	มากที่สุด	4.45	0.68	มาก
4. ความเครียด	4.50	1.00	มากที่สุด	4.33	0.67	มาก
5. ความวิตกกังวล	4.40	0.99	มาก	4.33	0.67	มาก
6. ความกลัว	4.30	1.08	มาก	4.00	0.85	มาก
7. การระบายความรู้สึก	4.17	0.92	มาก	4.20	0.63	มาก
8. ภาพลักษณ์	4.16	0.86	มาก	4.25	0.78	มาก
9. การสูญเสียพลังอำนาจ	4.12	0.78	มาก	3.93	1.29	มาก

จากตารางที่ 18 จะเห็นว่าตัวชี้วัดคุณภาพกลุ่มสุขภาพจิตสังคม สำหรับผู้ป่วยกลุ่มอาการหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน ประกอบด้วยรายการตัวชี้วัดด้านผลลัพธ์การพยาบาล จำนวน 9 รายการ ผลลัพธ์ที่ผู้มีประสบการณ์มีความคิดเห็นสอดคล้องกันในระดับมากที่สุด จำนวน 4 รายการ และระดับมาก จำนวน 5 รายการ ผลลัพธ์ที่ผู้มีประสบการณ์มีความเห็นสูงสุด 3 รายการแรก คือ กำลังใจและความหวังในการมีชีวิตอยู่ กับการสนับสนุนทางสังคมซึ่งรวมทั้งแหล่งทรัพยากร (ค่ามัธยฐาน 4.73 เท่ากัน) การปรับตัวและเผชิญปัญหา (ค่ามัธยฐาน 4.51)

ความเป็นไปได้การนำไปใช้ของตัวชี้วัดคุณภาพด้านผลลัพธ์การพยาบาล กลุ่มสุขภาพจิตสังคม ที่ประเมินโดยผู้มีประสบการณ์ จำนวนทั้งหมด 9 รายการ มีความเป็นไปได้ในระดับมากที่สุด เพียง 1 รายการ ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคม (คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.60) ส่วนรายการอื่นๆ อยู่ในระดับมาก จำนวน 8 รายการ

ความสำคัญของตัวชี้วัดคุณภาพด้านผลลัพธ์การพยาบาลและความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ของตัวชี้วัดคุณภาพกลุ่มสุขภาพจิตสังคมกลุ่มสุขภาพจิตสังคม มีความสอดคล้องกันในระดับมากที่สุดจึงมีเพียง 1 รายการ